

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2025-03-24

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Giltig till: 2027-03-12

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dubbel pigtailkateter-inläggning, byte och dragning

Syfte

Informationen är framtagen för att garantera en säker vård och ge ett strukturerat arbetssätt vid omhändertagande av patienter.

Arbetsbeskrivning

Patienten ska komma 30 minuter innan för att få premedicinering och antibiotika. (Se Premedicinering för mindre urologiska ingrepp)

- Kontrollera patientens identitet
- Sidomarkering görs av läkare som ska göra ingreppet.
- Fråga om eventuell allergi mot läkemedel, inklusive Xylocain.
- Gå igenom hälsoformuläret, be patienten fylla i det särskilda hälsoformulär som finns på sal 3.
- Tar patienten Waran ska ett PK-värde tas samma dag
- Antibiotika ges efter ordination
- Vid jodöverkänslighet, ges kortison efter ordination, innan kontrast sprutas in.

Inläggning och byte av dubbel pigtailkateter

- Sterilt gyn/cystset att lägga på patienten
- Sterilt cystoskopiset innehållande:
- Cystoskopihylsa Olympus Ch 22, rak optik 12°, lång optik 70°, Albaranbrygga + gummipluggar + penisklämma och ljusadaptar.
- Sterilpackat set med skålar
- Fyll en B8 skål med ca 50 ml koksaltlösning som dras upp med

en 10 cc spruta för att blötlägga guidewiren och kompresserna med

- Sterila kompresser
- Spoldroppsaggregat
- Xylocaingel
- Sterila handskar
- Dubbel pigtailkateter (storlek efter ordination)
- Guide-Wire
- Steril sax
- Praktiskt strålskydd
- Häng upp skylten ”strålning pågår” på dörren utanför.
- Röntgenförkläde och plastförkläde
- Genom inblandning minskas strålnippet och därmed den använda strålningsmängden.
- Genomlysningstid - KAP-värde $Cycm^2$ = totala strålningsmängden som patienten utsatts för och vilken personal som närvarat ska antecknas i datorn i mappen ”c-båge” sal 3.
- Lägg upp väntelistepost i Elvis om när nästa byte eller dragning ska ske.

Komplikationer

- Blödning
- Smärta på grund av svullnad i uretären, kan även bero på att katetern har perforerat uretären och urin läcker ut
- Urosepsis

Information efter undersökningen

- Ökat vätskeintag
- Sveda, trängningar och lite blod i urinen efteråt är inte ovanligt
- Antibiotika skickas med efter ordination
- Kraftiga smärtor och/eller feber >38 grader eller riklig hematuri uppmanas patienten att kontakta urologmottagningen eller söka akut
- Skicka med patientinformation

Dragning av dubbel pigtailkateter

- Man: Flexibelt cystoskop med lång krokodiltång.
- Kvinna: Stelt cystoskop och stel krokodiltång.

Ansvar

Vårdenhetschef på Urologimottagningen ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision:

Sektionsledare på Urologimottagningen ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i MedControl PRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-85

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-24

Giltig till: 2027-03-12