

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2025-03-24

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Giltig till: 2027-03-12

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Förlängd erektion, priapism-behandling

Revideringar i denna version

Ändring av dosering efedrin.

Syfte

Förlängd erektion (> 4 timmar) har rapporterats hos 4 % och priapism (smärtsam erektion > 6 timmar) hos 0,4 % efter intrakavernös injektion av Caverject®/Caverject Dual®.

Patienten bör instrueras att om erektionen varar > 4 timmar kan han försöka att med fysisk aktivitet få erektionen att gå tillbaka. Om detta inte hjälper får han söka akut.

Arbetsbeskrivning

Behandling

Injektion av alfa-adrenergikum intrakavernöst är oftast en tillräcklig åtgärd och har vanligtvis en snabb effekt. Om erektionen trots detta kvarstår ska patienten opereras, initialt med spolning av svällkropparna med grova nålar och eventuellt anläggande av distal shunt.

Tillvägagångssätt

Blanda 1 ml Efedrin® 50 mg/ml med 9 ml koksaltlösning, injicera 1–5 ml i ena svällkroppen och vänta 10–15 minuter, dosen kan vid behov upprepas.

Om erektionen trots detta kvarstår skall patienten opereras med anläggande av shunt.

Ansvar

Vårdenhetschef ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision:

Vårdenhetschef, ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i MedControl PRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-88

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-24

Giltig till: 2027-03-12