

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-02-28

Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Giltig till: 2027-02-28

Granskad av: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

## Arbetsbeskrivning

När färdigberedd kombinationslösning av Robinul-Neostigmin® inte finns att tillgå, används istället ett av följande alternativ:

**Inj. Atropin® 0.5 mg/ml, 1 mg (= 2 ml)**

**Inj. Neostigmin® 2.5 mg/ml, 2.5 mg (=1 ml)**

eller

**Inj. Robinul® 0.2 mg/ml, 0.5 mg (= 2.5 ml)**

**Inj. Neostigmin® 2.5 mg/ml, 2.5 mg (=1 ml)**

## Kunskapsöversikt

FASS

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

**Granskad av:** Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1036

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2025-02-28

**Giltig till:** 2027-02-28