

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2024-08-20

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-11-20

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköt

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Frontalsinus trepanation OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Version 3. Ändrat till layout enligt *SOFIA STY*. Sett över innehållet, rensat bort följande rubriker som inte är aktuellt för ingreppet; *Antibiotika, Blod, Vätskor, V-sond*.

Version 4. Ändrat rubrik från *Arbetsbeskrivning* till *Patient/Indikation*. Lagt in underrubrik *svalgpack* under *Luftväg*.

Patient/Indikation

(Operation enligt Barany) Görs vid svårare infektioner eller slemcystor (mucocele) i pannbihålorna och innebär att man förutom endoskopisk kirurgi inuti näsan också öppnar pannbihålan utifrån och tar bort sjuk slemhinna samt skapar en bred förbindelse mellan pannbihålan och näsan för att åstadkomma dränage.

Op. tid <60 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxikodon

Enl. [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Intravenös anestesi; Propofol + Remifentanil. Använd BIS/ Sedline om den ej tar plats i op. området.

Relaxantia: Ej nödvändigt för ingreppet. Muskelrelaxation alt.

Lidokainspray i larynx för intubationen.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs i vänster mungipa.

Svalgpack: JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#)

Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Positionering

Ryggläge enl. [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

Lätt höjd huvudända om möjligt.

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op. tid omkring 1h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning r/t beräknad tid för operation men bedömning måste alltid göras utifrån patientstatus och ingrepp.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Förväntade kritiska moment

Kärlrikt operationsområde. Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev Oxikodon.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Sektionsledare/Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska,
Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköt

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1066

Version: 6.0

Giltig från: 2024-08-20

Giltig till: 2026-11-20