

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-26

Giltig till: 2028-03-23

# Zygomatikusfraktur – Gilliesreposition OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Ändring av anestesi metod under rubrik *Anestesi*.

## Patient/Indikation

Zygomatikusfraktur. Operatören ”lyfter” tillbaka zygomatikus via ett litet snitt i tinningen.

**Op. tid < 20 min**

## Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin.  
Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och  
[Anestesi vid standardgrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardgrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

TIVA: Propofol / Remifentanil +BIS/ Sedline. Lidokainspray 4% (2-3 ml) i larynx.

## Luftväg

Oraltubation, tuben fästs i vänster mungipa.

## Förväntade kritiska moment

Se till att patienten är väl smärtstillad när ”lyftet” påbörjas då detta är ett smärtsamt moment.

## Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Antibiotikaprofylax

NEJ men vid samtidig ansiktsfraktur JA. enl. [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk.Ord.

## Markering av op-område

JA

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Positionering

Ryggläge, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

## Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

## KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid enl- RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#) men bladderscan ska kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#)

## Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev. oxikodon.  
PONV-profylax vb. / enl. ord.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Avdelningslärare/Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin Anestesisjuksköterska Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1081

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-03-26

**Giltig till:** 2028-03-23