

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-09

Hypofaryngoskopi och Epifaryngoskopi OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Rutinen har reviderats och sammanförts med rutinen för *Epifaryngoskopi vid OP 7 (AN)*.

Patient/Indikation

Hypofaryngoskopi: Malignitet, främmande kropp

Epifaryngoskopi: Klumpkänsla, smärta och/eller tumörmisstanke i epifarynx.

Op. tid <30 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och

RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

TIVA - Propofol + Remifentanil + BIS/Sedline. Muskelrelaxation för intubationen + Lidokainspray 4% i larynx.

Luftväg

Oraltubation, tuben fästs i vänster mungipa.

Förväntade kritiska moment

Om tumörväxt föreligger kan patienten vara svårintuberad.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Positionering

Ryggläge med sänkt huvudplatta enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h. Annars enligt RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](http://vgregion.se)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD om operationstid <2h. Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Tappning (om aktuellt) utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Postoperativ smärtbehandling

Ev. Oxikodon och/eller Klonidin.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1119

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-09