

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare
Granskad av: Camilla Blixt, (caml2), Instruktor
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-19
Giltig till: 2027-02-19

Explorativ laparotomi på Op 4 - Anestesirutin

Förändringar sedan föregående version

Komplettering i anestesimetoder med erektor spinae katetrar. Länkar till neuraxiala opioider och PONV rutiner. Komplettering med operationsbeskrivning. BIS/Sedline i speciella utrustningar.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår explorativ laparotomi på Op4.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod:

Intubation, Sevoflurane/Fentanyl + regional anestesi

- första val: Morfin-spinal (vgs.rutin [Neuraxiala opioider](#))
- vid planerat omfattande ingrepp TEDA (i samråd med kirurg)
- alternativt: bilaterala rektus sheath katetrar, bilaterala erektor spinae katetrar

Vid högrisk PONV vgs. rutin [PONV profylax, postoperativt illamående och kräkning - anestesirutin](#)

Premedicinering

Tabl. Oxycontin 0,1–0,2 mg/kg (max 15 mg)

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg

PONV profylax: Tabl. Betapred 4–8 mg, Tabl. Ondansteron 8 mg

(vgs. rutin [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

Operationstid: 2–4 timmar

Operationsbeskrivning

Explorativ laparotomi betyder per definitionem ett öppet snitt på bukväggen in till bukhålan för att kunna undersöka bukorganen, ställa en medicinsk diagnos och ev. åtgärda problemet. På Op 4 utförs det här ingreppet mest vid gynekologisk cancersjukdom och vanligtvis innehåller hysterektomi, salpingo ooforektomi, ev. appendektomi, omentresektion, lymfkörtlarutrymning beroende på fyndet i buken. Operationstid och omfattande av kirurgin kan variera.

Speciell utrustning

- artärnål
- 3 infarter (en av dem minst 17G 1,5 mm)
- V sond oralt
- NMT
- värmetäcke
- tempmätning
- blodvärmare
- BIS/Sedline

Allmänna synpunkter

Blodrekvisition: Blodgruppering. Bastest

KAD: Ja.

Uppläggning: Planbord, ryggläge. Två armbord, benremmar.

Antibiotikaprofylax: enligt läkemedelsmodul i Melior

Trombosprofylax: enl. ordination i Melior

Postoperativt

För smärtlindring kan regional anestesi kombineras med Oxikodone iv,
Paracetamol iv., Catapressan iv.

Granskare/arbetsgrupp

Camilla Blixt, Instruktör, Anestesisjuksköterska Op 4, AOI, Område 5,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marie Melander, Sektionsledare Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (caml2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1122

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19