

Gäller för: Intervention 1 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet

Giltig från: 2025-09-02

Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Giltig till: 2027-09-02

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Kemoembolisering (TACE) av primär levercancer

Revideringar i denna version

Desfluran borttaget

Arbetsbeskrivning

Patient: Kemoembolisering ger förlängd överlevnad hos patient med icke botbar HCC (dvs tumör ej åtkomlig för kirurgi eller RF). Kan även ges som bridge inför transplantation eller för att möjliggöra kirurgi (downsizing). Patienten får ej vara gravt leversviktande (Child Pugh >8p). Hjärtsvikt är en relativ kontraindikation då doxyrubicin är hjärttoxiskt – om > 6 TACE ska ges ska UCG beställas via avdelning.

Ingrepp: Radiologen går in via a femoralis och för in en kateter till lämplig leverartär där cytostatika ges.
Irinotecan används mot levermetastaser vid colorektal cancer vilket ger smärta postoperativt

Premed vuxen: T Panodil 1g

Till Irinotecanpatienter: Lägg till T. Oxycontin 10–20 mg.

Anestesi: GA med intubation. Propofolinduktion, TCI med Remifentanyl, muskelrelaxantia, Sevoflurane, syrgas/luft.

Ingreppet kan i särskilt utvalda fall göras i sedering efter diskussion med radiolog, dock önskas ofta apnéer för optimala betingelser.

Antiemetika: Hög frekvens av illamående!

Betapred iv 8 mg + ondansetron iv 4 mg.

OBS – kontrollera att patienten ej erhållit profylax preoperativt.

Blod: Blodgruppering

Antibiotikaprofylax: Enligt ordination från vårdavdelningen

Ord av radiolog: Enligt röntgenprotokoll och WebAdapt

Post op: Rutinmässigt 2 timmars uppvak på avd 95/UVA.

Postoperativt mindre smärta i jämförelse med leverartärembolisering då behandlingen är selektiv och vävnadsnekrosen mindre utbredd.

Till Irinotecanpatienter: PCA som aktiveras på postop.

Granskare/arbetsgrupp

Ulf Gerenmark, Sektionsledare, Anestesi 5,

Nastassia Hilding Werner, Avdelningslärare, Anestesi 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intervention 1 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1167

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02