

Gäller för: Central intensivvårdsavdelning  
Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-10

Giltig till: 2027-12-10

# Barn - Kraniofaciala ingrepp, ögonförband

## Revideringar i denna version

251001 Förlängd giltighetstid

## Syfte

Att förebygga svullnad över/runt ögon efter kraniosynostoskirurgi.

## Arbetsbeskrivning

Ögonförband fuktade med NaCl ska så snart som möjligt sättas på efter kranioplastik. Det är framför allt de barn som är opererade med PI-plastik och Metopicasynostoser. Dessa ingrepp är omfattande, involverar pannan och medför stor risk för svullnad över ögonen. Även stora blödningar kan förekomma i samband med dessa ingrepp som medför ökad svullnad.

Stripkraniotomi med fjädrar pga Sagital synostos och Unicoronal synostos behöver normalt inte ha ögonförband. Vid osäkerhet fråga operatören.

## Ögonförband

Till varje öga behövs tre kompresser. Trassla ihop den ena och lägg den mellan två platta kompresser. Fukta kompresserna med koksalt. Fäst kompresserna genom att linda en åtta runt barnets huvud, trycket fördelas då på ett bra sätt. Fukta kompresserna regelbundet och linda av med jämna mellanrum för att kontrollera så att inga veck uppstår se bilder nedan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



## Granskare/arbetsgrupp

Eva-Lena Tilly, Barnansvarig Intensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/IVA Område 5, SU

Maddeleine Lindström, Barnansvarig Intensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/IVA Område 5, SU

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Central intensivvårdsavdelning

**Innehållsansvar:** Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1179

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2025-12-10

**Giltig till:** 2027-12-10