

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare
Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-02-07

Lidokain vid induktion med Propofol - anestesirutin

Förändringar i denna version

250207 inga förändringar

Bakgrund

Smärta vid propofolinjektion/infusion är en välkänd biverkan och kan vara mycket obehaglig för vissapatienter. Användning av Lidokain kan lindra den smärtan.

I samband med Induktion med Propofol Infusion ges 1 ml Lidokain 10mg/ml i den PVK i omedelbar anslutning till anestesi start för att förhindra smärta och obehag för patienten.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8
Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare

Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1225

Version: 12.0

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-02-07