

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-06-01

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-06-01

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Näsreposition

Revideringar i denna version

Uppdatering av rubriker och typsnitt enl. Sofia STY - mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Tagit bort svalgpack.

Patient/Indikation

Näsfraktur i näsbenen är vanligt i alla åldrar och kan bero på olika skador tex fall, idrott eller misshandel. Om frakturen inte åtgärdas i akutskedet finns påtaglig risk för nedsatt näsandning och kosmetisk felställt utseende som kan vara svårt att åtgärda senare. Alla näsfrakturer som behöver opereras ska åtgärdas inom 7–10 dagar. Operation görs antingen i lokalbedövning eller i narkos där näsbenet återställs till en rak position.

Op. tid < 20 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib

Enl. [RUTIN 45314 Anestesi vid standardingrepp på operation 7](#) eller enligt läk. Ord.

Anestesi

Enl. [RUTIN 45314 Anestesi vid standardingrepp på operation 7](#).

Generell anestesi:

1. Larynxmask. TCI Propofol + Remifentanil
2. Oral intubation. TCI Propofol + Remifentanil + 4% Lidokainspray trachealt.

Relaxantia: Ej indikerat för ingreppet. Muskelrelaxation alt. Lidokain-spray i larynx för intubationen.

Luftväg

Oralintubation vid fraktur > 7–10 dagar då det finns större risk för blödning, tuben fästs i vänster mungipa annars larynxmask.

Prover/Undersökningar

Enl. [RUTIN 20091 Preoperativ provtagning och utredning op 7](#).
Eller enl läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. [RUTIN 13685 Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp](#). Eller enl läk. Ord.

Positionering

Ryggläge enl. [RUTIN 45619 Upplägg rygggläge av vuxen patient](#).

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <3h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h Däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

Trombosprofylax

Se [RUTIN 26711 Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi](#). Eller enl läk. Ord.

Förväntade kritiska moment

Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Postoperativ vård

UVA <1-2 h

Vid behov av syrgas använd mask vid transport till UVA.

Postoperativ smärtbehandling

Postoperativ smärtbehandling oftast endast vid behov.

Barn: Klonidin, Dynastat® och Perfalgan.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Sektionsledare/Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1300

Version: 7.0

Giltig från: 2026-06-01

Giltig till: 2028-06-01