

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-09-09

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2027-09-08

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Orbitabottenreposition OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Ändring av anestesi metod under rubriken *Anestesi*.

Patient/Indikation

Orbitabottenfraktur. Operatören går in under ögat och reponerar och fixerar med medpor eller plattor och skruvar. Samtidigt med ingreppet görs ibland en Gilliesreposition.

Op. tid < 2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin.
Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och
RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

TIVA – Propofol + Remifentanyl. Muskelrelax. BIS/Sedline om möjligt.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Förväntade kritiska moment

Patient kan bli bradykard när kirurgen trycker på ögat.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl. läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA enl. RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl. läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se) Eller enl. läk. Ord.

Blod

Blodgruppering och bastest: NEJ men vid omfattande ansiktsfrakturer eller om bicoronal flap JA

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl. läk. Ord.

Positioneringen

Ryggläge, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h. Annars enligt RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <2h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och Oxikodon.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Wessmark, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1306

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-09

Giltig till: 2027-09-08