

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-05-20

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-05-20

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Otoplastik OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Mall enligt SOFIA-STY.

Patient/Indikation

Detta är en typ av kosmetisk kirurgi som används för att göra öronen mindre utstående eller minska storleken på öronen.

Op. tid < 60 min

Premedicinering

Vuxna: Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Enl. läk. ord. Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7](#)

[\(vgregion.se\)](#) 7 och enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Intravenös anestesi – TIVA: Propofol /Remifentanil + BIS/
Sedline.

Luftväg

Larynxmask

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Positionering

Ryggläge, huvudet åt ena sidan beroende på vilket öra som opereras. Bilateralt så ändras huvudets position under operation. Byt armbordet till ett sidostöd, enl. [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD då op.tid är < 1h. Urinblåsan kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#). Om det skulle vara aktuellt med tappning alt sätta KAD görs det enligt RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). På barn gäller RUTIN [KAD-sättning och urintappning, Barn Sahlgrenska \(vgregion.se\)](#)

Postoperativ smärtbehandling

Barn: Klonidin, Dynastat®, Perfalgan.

PONV-profylax vb. / enl. ord.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, Tf. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1312

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-20

Giltig till: 2027-05-20