

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare
Granskad av: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-28

Giltig till: 2027-02-28

Läkemedelsbeskrivning

ATC-kod: N02AA05

Injektionsvätska Oxycodone 10 mg/ml

Indikationer

Förstahandspreparat för att peroperativt förebygga postoperativ smärta.

Kontraindikation

Överkänslighet mot preparatet eller ingående beståndsdelar.

Beredning för injektionslösning koncentration 1 mg/ml

1 ml injektionsvätska Oxycodone 10 mg/ml spädes med 9 ml NaCl 9 mg/ml till koncentrationen Oxycodone 1 mg/ml. Oxikodon finns i injektionsform även under ett annat produktnamn, Oxynorm.

Doseringsrekommendation

Oxycodone används peroperativt i samma dosering som Morfin och Ketogan dvs. 2,5 till 5 mg i.v. beroende på typ av kirurgiskt ingrepp och patientens ålder och vikt, eventuellt i upprepade doser.

Morfin, Ketogan och Oxycodone doseras i förhållandet 1:1:1.

För postoperativ smärtlindring se Rutin Oxikodon (Oxycodon) CIVA, Avd 22 och UVA. Se även Iva-sektionens Konverteringstabell för opioider.

Graviditet (kategori D) och amning (grupp III)

Oxycodone får inte tas under graviditet.

Oxycodone får inte tas vid amning, Oxikodon passerar över i bröstmjolk.

Övrig information

Oxikodon finns även i andra beredningsformer, i tablettform, T Oxynorm (kortverkande) och T Oxycontin (depotpreparat).

Hantering, hållbarhet och förvaring

Används omedelbart efter öppning. Oanvänd öppnad produkt skall kasseras.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning och utvärdering

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet

Källor

FASS.se för förskrivare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Granskad av: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1315

Version: 8.0

Giltig från: 2025-02-28

Giltig till: 2027-02-28