

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2026-09-16

Läkemedel - Paracetamol

Revideringar i denna version

240916

Förlängd giltighetstid

Syfte

Att säkerställa rätt hantering och administration av Paracetamol inom intensivvården.

Läkemedelsbeskrivning

ATC – kod: N02BE01

Filmdragerad tablett, Panodil 500 mg

Brustablett, Panodil Brus 500 mg

Infusionsvätska, lösning Paracetamol 10 mg/ml

Arbetsbeskrivning

Indikationer

Feber > 39 grader C

Smärta

Kontraindikation/observandum

Svår leversjukdom

Alkoholism

Nedsatt allmäntillstånd

Generell ordination

- Tablett Panodil 500 mg / brustablett Panodil Brus 500 mg: 2 tabletter max var 6:e tim
- Om tablett/brustablett ej är möjligt: infusion Paracetamol 10 mg/ml: 100 ml intravenöst max var 6:e tim. Paracetamollösningen ges som intravenös infusion under 15 minuter för att undvika blodtrycksfall. Bör inte blandas med andra läkemedel.

Kunskapsöversikt

FASS.se för förskrivare.

Granskare/arbetsgrupp

Nur Alwan, Apotekare, CIVA

Ulla Sandberg, Läkemedelsansvarig Sjuksköterska, CIVA

Lotta Börjesson, Instruktor CIVA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1322

Version: 10.0

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2026-09-16