

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-10-04

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-10-03

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Parotidektomi OP 7 (OP)

Indikation

Parotiskörteln består av en större ytlig del och en mindre djup. Gränsen mellan delarna utgörs av den 7:e kranialnerven, N.fascialis, som innerverar samma sidas ansiktsmuskulatur. Indikation för kirurgi är benign eller malign tumör i glandula parotis. I sällsynta fall kronisk sialoadenit.

Operationsläge

Ryggläge. Huvudet vridet så att den sidan som skall opereras pekar mot taket.

Plocklista

Medicinteknisk apparatur

- Medtronic NIM-Response 3.0
- Ev. Mikroskop
- Ev. Stryker borr

Sterilcentralen

- Mjukdelsgaller
- ENT- set
- Operationsrock

Sterilförrådet

- Peang Bontempi gracil 12,5cm Art.nr: P-102/21-2132
- Magnetmatta
- Lamphandtag
- Ev. Sax Baby Metzenbaum böjd 14,5cm
- NIM-elektroder 2 eller 4 kanaler
- NIM – probe

Läkemedel/vätskor

- Carbocain-Adrenalin 5mg/ml+5µg/ml
- Utspädd sprit 70%
- NaCl 0,9% 1000ml
- Ev. Väteperoxid 15mg/ml

Operationssalen

- 3-0 Polysorb ligaturhjul
- 3-0 eller 4-0 Vicryl SH
- 2-0 Ethibond
- 4-0 Ethilon FS-2
- Absorberande förband
- Steristrips
- Litet absorberande förband till dränaget
- Skinhooks
- Dränage nr 10 eller 14
- Bomullspinnar till steriltvätt
- Uppsamlingspåse
- Tegaderm
- Genomskinlig draperingsduk
- Ev. Vessel Loops

Sterildrapering

Eventuellt behöver man håravkorta lite bakom/ovanför örat.

Använd utspädd sprit 70 % och tvätta halva ansiktet, inklusive pannan, hela örat och ner till clavikeln och sternums övre del. Använd tegaderm över ögonlock (ej på ögonbrynet), näsa och mun. Därefter en genomskinlig draperingsduk ner över den otvättade ansiktshalvan och tuben.

U-lakanet sätts så att halsen är fri ner till sternum. Örat ska vara synligt. Klä långt ner på halsen på op.sidan. Se till att det finns plats för NIM-elektroder i ansiktet (pannan fri). Fäst uppsamlingspåse.



Metod

Ritar. Infiltrationsanestesi. Elektroder för nervmonitorering sätts på plats (oftast 4 kanaler). Snitt framför hörselgången och ner runt örsnibben, följer två tvärfingrar nedom mandibelkanten. Flapparna friprepareras och hålls undan med skinhooks+peang. Fascialis huvudstam identifieras och följs framåt, superficiella parotis fridissekeras. När tumören utgår ifrån den djupa delen av parotis används vessel loops för att lyfta upp fascialisnervgrenarna för åtkomst. Vid cancer växer tumören ibland in i fascialisnerven som då behöver recesseras. Det kan då bli aktuellt med uppborrning av mastoid längs med fascialiskanalen för att komma till frisk nerv och dela där. Ibland sker sedan rekonstruktion med hjälp av N.auricularis eller en N.suralis. Vid behov tas även den djupa delen. När preparatet är ute och blodstillning har utförts spolar eventuellt kirurgen först med Väteperoxid 15mg/ml och efter det NaCl. Dränage sätts. Suturering. Förband.

Övrigt

Metodkortet avser både superficiell och total parotidektomi

Förändringar sedan föregående version

Andra utgåvan. Uppdatering på grund av utgången datum samt ny layout.

Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

Marie Hansson, Operationssjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingrid Rudberg, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Marie Hansson, (marha118),
Operationssjuksköterska, Ingrid Rudberg, (ingru7), Överläkare,
Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1323

Version: 5.0

Giltig från: 2025-10-04

Giltig till: 2027-10-03