

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2024-05-24

Innehållsansvar: Kristjan Karason, (krika23), Universitetssjukhusö

Giltig till: 2026-05-10

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

# Kombinationsingrepp för hjärttransplanterad patient – hjärtkatetrisering, coronarangiografi, hjärtbiopsi - checklista.

<b>Patient-ID</b>
-------------------

Åtgärd	Datum	Signatur	Anmärkning
Informera patienten			
ID-band på vänster handled och sängmärkning			
Överkänslighet? Om överkänslig mot kontrast, se rutin "Överkänslighet mot kontrast"			
Sekretess?			
Utomlandsvård senaste 10 år eller i riskregion i Sverige			
Känd blodsmitta?			
Inskrivning av sjuksköterska i Melior och Elvis			
12-avlednings-EKG			
NEWS-kontroller			
PVK (rosa) i vänster arm			
Hb, LPK, TPK, Krea, Na, K, PK, Aptt (ej äldre än tre dagar)			
Blodgruppering (ej äldre än från 1991)			
Om kalium utanför referensintervall, kontakta kardiologlab			

Om PK >2.5, kontakta kardiologlab			
Krea >120 män Krea >110 kvinnor Se rutin "Uppvätskning inför undersökning av röntgenkontrast med risk för njurinsufficiens"			
OBS! Vid diabetes uppvätskas patient om kreatinivärde överstiger övre normalgräns			
Metformin utsätts i minst 48 timmar efter undersökningen. Återinsättes när kreatinin återgår till utgångsvärde			
Vid risk för kontrastallergi: Läkarkontakt: Överväg: Betametason 8 mg i.v Tavegil 2 mg i.v. 1 timme före undersökn.			
<b>Undersökningdagen:</b>			
Dusch (ej behov av Descutan)			
Renbäddad säng med tygdrag och rena patientkläder			
Koppla NaCl 1000 ml med trevägskran (kan gå fritt om ej behov av uppvätskning pga högt kreatinin, vg se rutin)			
Fast föda fram till fyra timmar före undersökning			
Klara drycker fram till två timmar före undersökning			
Total fasta två timmar före undersökning			
EMLA på vena jugularis höger sida av halsen samt art. radialis både höger och vänster handled			
Premedicinering ska erbjudas alla patienter, T. Stesolid 5 mg och T. Ketogan 5 mg			
Blodsocker på diabetiker			
Urinblåsa tömd kl:			
Inget nagellack, inga smycken			
Patientjournal med till kardiologlab			
<b>Efter undersökning:</b>			

Följ ordinationer från kardiologlab			
NEWS-kontroller			
Kontroll av insticksställe			
Se rutin gällande respektive kärlförslutningssystem			
<b>Vid hemgång:</b>			
Inspektion av insticksställe			
Ta bort ID-band och PVK			
Välbefinnande			

<b>Vid rejektion:</b>			
Kontakta kardiologbakjour om biopsisvar är ISHLT 2R eller ISHLT 3R			
Om öppenvård - kontakta patienten för inläggning på avdelningen			
Inskrivning av sjuksköterska i Melior och Elvis			
ID-band och sängmärkning			
PVK			
Telemetriövervakning			
Blodsockerkontroll			
Starta rejektionsbehandling enligt ordination			

### Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Transplantationscentrum

**Innehållsansvar:** Kristjan Karason, (krika23), Universitetssjukhusö

**Godkänd av:** Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-149

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-05-24

**Giltig till:** 2026-05-10