

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-09-22

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2027-09-22

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Submandibularisextirpation OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*.

Patient/Indikation

Spottkörtelcancer, inflammation eller spottsten. Glandula submandibularis är en av kroppens tre stora [spottkörtlar](#) (gl. submandibularis, gl. sublingualis, gl. parotis). Den är belägen under mandibeln (underkäken) och producerar ungefär 60% av saliven. Kirurgi är den primära behandlingen av spottkörtelcancer. Ofta opereras även närliggande lymfkörtlar på halsen

Op. tid < 2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin.
Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Generell anestesi; Sevofluran, Fentanyl och muskelrelaxation.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Blod

Blodgruppering och BAS-test ska övervägas och ordineras av operatör om det finns indikation. Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Positionering

Ryggläge, huvudet åt sidan enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h. Annars enligt RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <2h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev. Oxikodon.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/OP/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lina Wessmark, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/OP/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1521

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-22

Giltig till: 2027-09-22