

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2026-09-19

# Läkemedel - Sugammadex (Bridion)

## Revideringar i denna version

240916 Mindre justeringar

## Syfte

Att säkerställa rätt hantering och administration av Sugammadex inom intensivvården.

## Läkemedelsbeskrivning

**ATC – kod: V03AB35**

Bridion injektionsvätska, lösning 100 mg/ml

pH 7- 8

Selektivt reverseringsmedel

## Arbetsbeskrivning

### Indikation

Omedelbar reversering av neuromuskulär blockad hos vuxna, som har inducerats med rocuronium eller vekuronium

### Kontraindikation/observandum

Kan behöva upprepas

Kan ge ökad blödningsbenägenhet

Ej rekommenderat vid kraftigt nedsatt njurfunktion/dialys

Försiktighet vid kraftigt nedsatt leverfunktion

Risk för bradykardi minuterna efter administrering (sällsynt).

Vid återadministrering av rocuronium och vecuronium under det första dygnet efter reversering med sugammadex kan försämrad effekt förväntas och ev dosjustering behöva göras, se FASS.

### Dosering för omedelbar reversering:

Injektionsvätska Bridion 100 mg/ml, 16 mg/kg enligt tabeller nedan

<b>Sugammadex (Bridion) 100 mg/ml: 16 mg/kg</b>		
<b>Vikt (kg)</b>	<b>Mängd (mg)</b>	<b>Volym (ml)</b>
40	640	6,4
45	720	7,2
50	800	8,0
55	880	8,8
60	960	9,6
65	1040	10,4
70	1120	11,2
75	1200	12,0
80	1280	12,8
85	1360	13,6
90	1440	14,4
95	1520	15,2
100	1600	16,0
105	1680	16,8
110	1760	17,6
115	1840	18,4
120	1920	19,2

### Beredning

Spädes ej till vuxna

### Administrering och kompatibilitet

- Ges som snabb intravenös bolusinjektion inom 10 sekunder
- Administreras i separat skänkel/infart eller tillsammans med NaCl 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Ringer-Acetat
- Den intravenösa infarten måste spolas ordentligt (t ex med 0,9% natriumklorid) mellan administrering av Bridion och andra läkemedel.

### Förvaring och hållbarhet

Förvaras vid högst 30°C. Förvara injektionsflaskorna i originalförpackning, ljuskänsligt. Bruten injektions sparas ej.

## Kunskapsöversikt

FASS.se för förskrivare.

## Granskare/arbetsgrupp

Nur Alwan, Apotekare, CIVA

Ulla Sandberg, Läkemedelsansvarig Sjuksköterska, CIVA

Lotta Börjesson, Instruktor, CIVA

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,  
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,  
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ  
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

**Innehållsansvar:** Per Persson, (perpe8), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1523

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-11-07

**Giltig till:** 2026-09-19