

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18

Tenckhoffkateter – anestesisrutin

Revideringar i denna version

Tillägg av att ingreppet i undantagsfall kan göras i lokalbedövning

Arbetsbeskrivning

Anestesi

Generell anestesi, intubation

- *Vid endast uttag Lokalanestesi + eventuellt sedering (vb. narkos).*

Induktion

Propofol, Remifentanil,
Rocuronium.

Underhåll

Remifentanil, Sevofluran
(alternativt propofol). I
undantagsfall kan ingreppet ske
i lokalanestesi.

Monitorering

- 3 avl EKG
- NIVBT
- Sömndjup
- NMT

Infarter/utfarter

- PVK

Premedicinering

Paracetamol

Blodrekvisering

Blodgruppering.

Positionering

Ryggläge enligt metodkort [länk](#)

Trombosprofylax

Enligt läkemedelsmodul i
Melior

Antibiotikaprofylax

Enligt läkemedelsmodul i
Melior

Smärta

Lokalanestesi i portarna. Ev
paracetamol om patienten ej
fått i premedicineringen

Bakgrund

Tenckhoff-kateter läggs in på patienter med uremi för att möjliggöra
peritonealdialys. Ingreppet görs laparoskopiskt via två portar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Granskad av: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare, Johan Teandersson, (johte5), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1544

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18