

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare
Granskad av: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-18

Giltig till: 2027-05-18

Tonsillektomi och Tonsillotomi

Postoperativ vård BARN och VUXEN

Revideringar i denna version

250218 Postoperativ vård tillagt i titel och förtydligande av syfte. Morfin tillagt som postoperativ smärtlindring till barn.

Syfte

Säkerställa och förtydliga rutiner i postoperativ vård av patienter som genomgått tonsillektomi eller tonsillotomi. Gäller för både barn och vuxna.

Arbetsbeskrivning

Vid **tonsillektomi** tar man bort hela tonsillen, antingen en eller båda tonsillerna. Oftast beror det på upprepade halsflussar. Vid **tonsillotomi** tas en del av tonsillen bort, oftast på barn pga att tonsillen är förstorad och orsakar snarkning och försvårad andning under sömn.

Komplikationer

Blödning, patienten börjar spotta blod eller koagler. **Kontakta alltid operatören i första hand**, om person ej går att nå ring öronjour <tel:29191> samt ansvarig narkosläkare på Postop 95.

Vid blödning: sätt patienten upp med framåtböjt ansikte och låt blodet rinna ut, patienten ska undvika att hosta eller harkla sig. Vid stor blödning kan patienten behöva åka in till operation igen för blodstillning.

Kontroller/Åtgärder

Kontrollera alltid i munnen när patienten kommer och innan patienten skickas till avdelning.

Aktivitet

Patienten skall alltid vårdas med höjd huvudända, minst 45°.

Smärtlindring

Patienten kan ha mycket ont i halsen, ibland strålar även smärtan ut mot öronen. För att patienten skall undvika att hosta eller harkla sig för mycket är god smärtlindring viktigt.

Vuxna

Oxycodon och Paracetamol.

Barn <12 år:

Paracetamol ges i.v. på operation och därefter var 6:e timme.

NSAID: om Parecoxib (Dynastat) ges på operation kan Ipren eller annan NSAID ges efter ca 10 timmar.

Om Dynastat ej givits, kan Mixtur Ibuprofen 20 mg/ml ges efter samråd med operatör.

Morfin iv vb enligt generell ordination.

Klonidin ges oftast som premedicineringen eller under operation. Kan upprepas vid behov iv eller per os.

Barn > 12 år kan ha svårt att svälja tabletter.

Antibiotikaproylax

Kirurgordination, se läkemedelsmodul i Melior.

Vätskebehandling och Nutrition

Kall dryck eller isglass får intas så snart patienten vill.

Illamående och kräkning kan förekomma, oftast pga att blod runnit ner i magsäcken under operation. Antiemetika kan ges som inj Ondansetron och inj Primperan iv.

Postoperativ vårdtid

Minst 2 timmar.

Granskare/arbetsgrupp

Anita Wold Gustafsson Intensivvårdssjuksköterska PIVA 22 och Postop
95 AnOpIva Omr 5, SU

Erika Wanne Instruktor AnOpIva Omr 5, SU

Jonas Grevsten Överläkare AnOpIva Omr 5, SU

Tobias Ullerstam Överläkare AnOpIva Omr 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare

Granskad av: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1560

Version: 8.0

Giltig från: 2025-02-18

Giltig till: 2027-05-18