

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-28

Giltig till: 2027-11-28

Transurethral resektion av blåstumör (TUR-B), anestesirutin

Revideringar i denna version

Uppdaterat utseende

Arbetsbeskrivning

Anestesi

Larynxmask TIVA propofol/alfentanil

Spinal när generell anestesi är kontraindicerad

Positionering

Benstöd enligt Positioneringsrutin, [Länk](#)

Blodrekvisition

Bastest vid stora blåstumörer. Polikliniska patienter behöver inte vara bastestade, då de har små tumörer.

Trombosprofylax

Enligt läkemedelsmodul i Melior

Antibiotikaprofylax

Enligt läkemedelsmodul i Melior

Anestesiologiska beaktanden

Observera tidsaspekten i benstöd

Rutiningrepp vid ytlig icke muskelinvasiv blåscancer, tar cirka 30-45 minuter. Elektiva operationer är ofta polikliniska. Akuta operationer görs framförallt på grund av kraftig hematuri/blåstamponad.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1587

Version: 10.0

Giltig från: 2025-11-28

Giltig till: 2027-11-28