Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-27
Giltig till: 2026-12-30

Trombektomi vid Covid-19

Revideringar i denna version

Första utgåvan.

Syfte

Att säkerställa säker vård vid cerebral trombektomi för patient och vårdgivare vid säkerställd eller misstänkt infektion av Covid-19.

Arbetsbeskrivning

Värdering av möjlig Covid-19 smitta:

Patienten betraktas som Covid-19 smittsam vid:

Bekräftad infektion med Covid-19

eller

Nytillkomna symptom på luftvägsinfektion där feber och hosta är vanligast förekommande

Ansvarig neurolog ansvarar för ovanstående bedömning och meddelar snarast ansvarig anestesiolog tel 28221 att patienten kan vara smittsam. Anestesiolog vidarebefordrar denna information till övriga i anestesi-teamet.

Peroperativt omhändertagande av smittsam patient:

Omhändertagande ske enligt gängse rutin för cerebral trombektomi men med följande i beaktning

- Ansvarig anestesiolog bör vara specialistkompetent
- Lab i12 används i första hand.
- Minimera antal personer på sal
- Använd skyddskläder enligt Vårdhygiens rutin för Covid 19.
- Val anestesiform påverkas i stort ej av COVID-misstanke. Pågående hosta och samt ökat syrgasbehov är stärker indikationen för generell anestesi.
- Vid val av generell anestesi, se PM för säker intubation och extubation vid Covid-19 smitta.
- Vid generell anestesi påbörjas steril tvätt och dukning först efter genomförd intubation.
- Medföljande personal ska ej gå in i manöverrum innan skyddskläder tagits av.

Vid respiratorisk svikt:

Vid begynnande eller manifest respiratorisk svikt (ARDS) bör lungprotektiv ventilation samt restriktiv vätsketillförsel användas.

Extra utrustning på sal:

Skyddskläder enligt vårdhygiens rutiner
”Covid-19 vagn” – med utrustning för att undvika onödig kontaminering av narkosbord

- **Postoperativt omhändertagande av smittsam patient:**
- Patienter som fått sedation kan enligt gängse rutin flyttas direkt till strokeavdelning. Ansvarig neurolog ansvarar för att vårdplats finnes efter avslutad behandling.
- Vid generell anestesi är målet såsom tidigare att extubera patienten snarast efter genomförd behandling. Se sid 2 säker intubation och extubation vid Covid-19 smitta.
- Bedöms postoperativ övervakningstid till max 2 timmar sker postoperativ vård på aktuell interventionssal med befintlig narkospersonal. Om patienten bedöms kräva längre övervakning alternativt ej kan extuberas väljs postoperativ vårdplats efter rådande platssituation.

Transport av patient till vårdavdelning:

- Vid transport till avdelning ska i första hand personal från strokeavdelning hämta patienten på intervention. Vid resursbrist från avdelning transporterar anestesipersonal såsom tidigare.

- Inför transport byter vi i dessa fall förkläde och handskar enligt vårdhygiens rutin.
- Munskydd (ej andningskydd) sätts på patienten inför transport. Om syrgas behövs under transport tas istället handduk eller liknande med som patienten kan hosta i.

Ansvar

Verksamhetschef för AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvarig ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Nordanstig, Neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Petra Redfors Neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Alexandros Rentzos, Neurointervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1591

Version: 6.0

Giltig från: 2026-08-27

Giltig till: 2026-12-30