

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention,  
Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-07

Giltig till: 2027-05-07

Innehållsansvar: Annette Verlinden, (annve4), Instruktör

Granskad av: Ann-Sofie Uppman, (annno41), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Positionering vid främre halskirurgi

## Revideringar i denna version

Tredje upplagan.

## Syfte

Rutinen visar positionering i ryggläge för främre halskirurgi utan sträck på både operation 1 och operation 8.

## Arbetsbeskrivning

- Patienten skall ha en operationsmössa av modell ”Peggy” eller ”Kosack”. Under patientens huvud Vakuumkudde och två gröna operationshanddukar, varav en vikt i trekant. Lägg huvudkudden ovanpå.
- Ryggläge med armarna längs med kroppen. Se positionering ryggläge [länk](#)
- Venkudde för bästa komfort och för att tryckavlasta hälar.
- Armskena plexiglas 2 st
- Polstra armskenor. Tummen ska ligga upp.
- Sätt i öronproppar.
- Tejpa ögonen enl rutin [länk](#)
- Operatören är med och fixerar huvudets läge med hjälp av vakuumkudden.  
*OBS! Detta görs innan slangarna fixeras!*
- Var observant på risken för tryckskador! Kolla att örsnibbarna inte är vikta. Se till att patientens huvud vilar på huvudplattan och att axlarna är fria från tryck
- Operatören tejpar ner axlar och ev bröst (se bild nedan) för att få ett optimalt kirurgiskt läge.

## Specifikt för anestesipersonal

- En noggrann fixering av endotrachealtub enligt rutin länk och narkosslangar är nödvändig, då patientens huvud är täckt under operationen.
- Använd långa andningsslangar, vinklad spirometrislang som skall mynna uppåt annars finns risk för kondensbildning och ocklusionslarm.
- Koppla kuffmätningsslangen. Se till att slangarna inte knickas.
- Lägg en liten skumgummikudde på patientens panna utan att täcka ögonen, och dra alla narkosslangar, V-sond och kufftrycksmätare bakåt över kudden. Fixera alltihop med grön duk och handduksklämmare.
- Fixera slangarna på sidan av huvudplattan och dra åt sidan
- Drag ner narkosapparaten till patientens vänstra sida och fixera slangarna med en stasslang eller bomullsband i operationsbordet så att röntgenröret kan rotera fritt under huvudplattan.



## Operationsbord

### Operation 1

Standardbord med vacumkudde för huvud

Venkudde för bästa komfort och avlasta hälar för tryck

### Operation 8

Lång kolfibertopp eller standard operationsbord med kolfibertillsats och huvudplatta.

**Sal 85:** Anestesi står vid dörren, Dra ner madrassen ca 40 cm för plats till vacumkudde för huvud.

Tillbehörsskena lång, på vänster sida av kolfibertoppen.

Armsupport i skumgummi 2 st alternativ polstra med täcke.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Annette Verlinden, (annve4), Instruktör

**Granskad av:** Ann-Sofie Uppman, (annno41), Instruktör

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1615

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-05-07

**Giltig till:** 2027-05-07