

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-04-14

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2028-04-14

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Akut mastoidit (uppmejsling) OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Mall enligt STY-SOFIA.

## Patient/Indikation

Akut mastoidit, operationen utförs oftast akut. Kirurgen går in bakom örat in i cellsystemet och dränerar.

**Op. tid <3 h**

## Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib  
Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och  
[Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Intravenös anestesi – TIVA med Propofol + Remifentanil + BIS/Sedline.

Muskelrelaxering för intubationen och/eller lidokainspray 4 % i larynx beroende på förväntad operationstid.

## Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

## Förväntade kritiska moment

Tänk på att operatören sitter i ett mikroskop och minsta patientrörelse eller operationsbordsrörelse kan vara förödande för operationsresultatet. Rör inte patienten utan att meddela operatör först.

## Trombosprofylax

Enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Antibiotikaprofylax

JA då det är en pågående infektion. Se RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

## Markering av op-område

JA

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Positionering

Ryggläge, huvudet åt sidan, byt armbordet till ett sidostöd, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

## Temp

Då operationstid är ca 3h så är det aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning via KAD enligt RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

## KAD/Bladderscan

Aktuellt med KAD om operationstid är 3h. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). För kontroll av blåsfyllnad se RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#)

## Postoperativ smärtbehandling

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Klonidin. Undvik opioider. Stor risk för postoperativt illamående.  
PONV-profylax i.v. enligt läkarordination.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,  
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1628

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-04-14

**Giltig till:** 2028-04-14