

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska, Verksamhet

Giltig från: 2025-04-29

Hybrid och intervention, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet

Giltig till: 2027-04-29

Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Venös kärldmissbildning Embolisering

Revideringar i denna version

Anestesi ändrad till TIVA samt tillägg av Arcoxia som premedicinering.

Postop information tillagt.

Arbetsbeskrivning

- Patient:** Venösa kärldmissbildningar förekommer hos både barn och vuxna och kan ge funktionsstörningar och vara kosmetiskt störande.
- Ingrepp:** Radiologen punkterar percutant och injicerar läkemedel. Behandlingen ger alltid en övergående svullnad. Problem kan uppkomma om svullnaden ger postoperativa andningssvårigheter. Radiolog och anesthesiolog kommer överens om patienten inte ska extuberas på röntgen. Ibland kan själva missbildningen ge intubationsproblem. Behandlingen sker i flera seanser. På många patienter görs en kompletterande plastikkirurgisk operation.
- I de fall Bleomycin används som skleroserande substans ges inte mer än 30 % O2 peroperativt och 1–2 liter O2 nasalt postoperativt. Anledningen är att minimera risken för utveckling av lungfibros vilket kan vara en komplikation av bleomycinadministrering.
- Premed vuxen:** T Panodil 1-2g, Arcoxia 60-120mg
- CAVE** Kortison pga sämre inflammatoriskt svar

Anestesi:	Generell anestesi med intubation om behandlingen sker kring ansiktet. TCI med Propofol och Remifentanil, Rocuron, syrgas/luft. Generell anestesi med larynxmask vid övriga ställen på kroppen. TCI med Propofol och Remifentanil, syrgas-luft. Regional blockad kan förekomma.
Post-op:	Majoriteten av dessa patienter är dagkirurgiska. Obligata slutenvårdspatienter är de där interventionist bedömer behov av respirationsövervak post op och de pat där man behandlar orbita.
Blod:	Blodgruppering endast i speciella fall.
Ordination av radiolog:	Enligt röntgenprotokoll och WebAdapt.

Granskare/arbetsgrupp

Nastassia Hilding Werner, instruktör Anestesi 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1665

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-29

Giltig till: 2027-04-29