

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-02

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-04-30

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod TMS Tumor Medulla Spinalis

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: TMS, version 1. Justerat layout efter överflytt från Barium till STY. I dokumentet finns även länkar kopplat till positionering bukläge.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:	Kraniectomis Rock Standard XL, Rock Goretex 50-80 kg Rock Goretex 80-110 kg Ryggaller Mikroset Midas Rex MR8
Sterilförrådet:	2 kopp cylinder Lamphandtag Handdukar Ev. Sonopet IQ med spolset
Operationsal:	Benvax Floswitch Spongostan, Surgicel Mikrosskopskydd Asspåsar till C-båge alt. kokong NaCl 9mg/ml Ringer-Acetat Väteperoxid 30 mg/ml

	Klorhexidinsprit 5mg/ml
Extra instrument:	Tumörpincett Metallsug 1,5mm Metallsug 1mm
Extra instrument ev:	Malis bipolärpincett x-smal Rose Gold bipolärpincett + kabel Aesculap Nålförare Lawton mikro rak Epitome Adsonhakar djupa Mayfieldpiggar Midas Rex munstycke lila (rakt eller vinklat) med sidecutter Metallsug 2 mm Stanskit (Thorakalset 1+2+3 mm el. Lumbalset 3+4+5 mm)
Medicinteknisk utrustning:	Mikroskop inställt på face to face. Montera bryggan på mikroskopet när patient har huvudet mot dörren C-båge Midas Rex Borr MR8 Bipolär diatermi Monopolär diatermi Sug
Salsplacering:	Huvudet mot dörren
Positionering:	Bukläge: HYBIOP 5 Metod- Bukläge med Mayfield huvudstöd (vgregion.se) HYBIOP 5 Metod- Bukläge med Ossanobrygga (vgregion.se)
Anestesi:	Allmän och lokalbedövning
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml Marcain-Adrenalin 5mg/ml
Sterildrapering:	Kraniectomisat Mikroskopskydd Asspåse 2 st till C-båge Sug och diatermipåse
Huddesinfektion:	Descutansvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Medellinjen

Suturer:	Vicryl 4/0 till uppsyningar av duran och suturering av duran Vicryl 0 till muskel Vicryl 2/0 till muskel Ethilon 3/0 hudsutur eller stapels för hudförslutning
Förband:	Mepilex Post op. Det finns även längre, Mepilex Post op (10 x 20cm och 10 x25 cm) Ev. Steristrip
Övrigt:	Spolkateter Rusch storlek 6 uppkopplat till spolpåse. Se op. Anmälan, kontakta ev. Neurofys. C-båge används för att indikera rätt nivå före operationsstart. Fråga kirurg om C-bågen skall vara kvar på salen intraoperativt.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Vårdenhetschef, Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Sofia Gustafsson, avdelningslärare/opssk Hybrid Intervention och
Operation 5

Johanna Eriksson, undersköterska Hybrid Intervention och operation 5

Annika Stephensen, sektionsledare/opssk Hybrid Intervention och
Operation 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1778

Version: 7.0

Giltig från: 2025-05-02

Giltig till: 2027-04-30