

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-01-10

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-01-09

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

# HYBIOP5 Metod Tracheostomi

## Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

## Arbetsbeskrivning

<b>Sterilcentralen:</b>	Trachgaller Käkkirurgset (2 engångsrockar i setet) 1 Rock High Performance 50-80 kg 2 Rock High Performance 80-110 kg
<b>Sterilförrådet:</b>	<b>Traklådan:</b> Fuktfiler, kopplingsstycke, Tork orange, PermaFoam förband Trachealtuber, ta med 2 st av varje storlek + 2 st innerkanyler till respektive storlek av valda trachealtuber Lamphandtag
<b>Medicinteknisk utrustning:</b>	Coa-Comp Sug
<b>Salsplacering:</b>	Huvudet mot dörren
<b>Positionering:</b>	Ryggläge, placera trachband under nacken. Kudde, alternativt en blodtrycksmanschett under brösttrygg för att tydligt kunna identifiera larynx och trachea. Ev. gelring under huvudet.
<b>Anestesi:</b>	Allmän och lokal
<b>Läkemedel:</b>	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml
<b>Sterildrapering:</b>	Kärkkirurgiset. Dropera så att hakan käkvinklar och jugulum syns. Fäst

draperingen på narkosbågen så att narkosen lätt kan komma åt tuben.

<b>Huddesinfektion:</b>	Descutansvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
<b>Snitt:</b>	Tvärsnitt på halsen ca 5cm
<b>Suturer:</b>	Ethilon 3/0 FS-1 till huden Ev Vicryl 3/0 ligatur Ev Vicryl 3/0 SH suturligatur
<b>Förband:</b>	PermaFoam Skumgummiband att fästa tuben med
<b>Övrigt:</b>	Kontrollera att kuffen på trachealtuben är intakt. Ha trachtub, kuffspruta, sug och Carlens hakar i beredskap när trachea ska öppnas. Narkosläkaren drar långsamt tuben i samråd med öronläkaren samtidigt som öronläkaren för ned trachealkanylen på plats. Tuben dras inte förrän operationen är färdig och patienten ventileras utan svårigheter. En extra innerkanyl ska alltid skickas med patienten. <b>Tracheostomi på vårdavd/IVA:</b> Trackgaller Bipolärpincett/kabel CoaComp Tracklåda Tuber (fråga vilken storlek) Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml

## Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen, Sektionsledare Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson, Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Omr 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

**Godkänd av:** Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1779

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-01-10

**Giltig till:** 2027-01-09