

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Mattias Danielsson, (matda5), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-22

Cerklage-extirpation - Anestesi

Revideringar i denna version

Arbetsbeskrivning

Indikation

Extirpation av cerklage efter hjärtoperation

Förberedelser på sal

- Ventilator: Funktionskontroll
- Defibrillator: Funktionstest
- Varmt på sal
- Warmtouch
- Läkemedel: Se nedan

Premedicinering

- Enl PM Premedicinering

Övervakning och infarter

- 2 PVK
- Tryckmätning NIBP
- EKG 5-avledning
- BIS
- Pulsoximetri

- ETCO₂ mätning
- TOF

Uppläggning

- Ryggläge

Vätskor

- Kristalloid

Blodgruppering/Bastest

- Ja/Ja

Antibiotikaprofylax

- Enligt kirurg

Läkemedel och Anestesi

- 1–2 TCI pumpar
- Induktion och underhåll: TCI Remifentanil (50 µg/ml) och TCI Propofol (20 mg/ml)
- Ev. Rocuronium (10 mg/ml), 0,6 mg/kg kroppsvikt
- Intubation, oral tub, eller larynxmask
- Noradrenalin (0,01 mg/ml)
- Ev. Efedrin (5 mg/ml)
- Reversering av ev. muskelrelaxation: Robinul-Neostigmin (0,5mg/ml + 2,5 mg/ml), 1 ml eller Sugammadex 100mg/ml

Postoperativ smärtlindring

- Oxikodon IV. Ges 30 minuter före operations slut
- Be ev. kirurgen lägga LA i såret
- VAS ≤ 3 när patienten lämnar OP3
- Uppvak på TIMA

Relaterad information

PM TIVA/TCI

PM Remifenanil

PM Förberedelser och kontroller inför intravenös anestesi

PM Ryggläge

Granskare/Arbetsgrupp

Mattias Danielsson, Överläkare thoraxanestesi och intensivvård,
Thoraxoperation, OP2, Verksamhet Thorax och kardiologi

Lars Jensen, Anestesisjuksköterska/Instruktör, Thoraxoperation, OP2,
Verksamhet Thorax och kardiologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Mattias Danielsson, (matda5), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1881

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-22