

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Preoperativa förberedelser vid AB0-inkompatibel njurtransplantation, levande donator

Senast dagen före operation	Datum	Sign
Ingår patienten i en studie? JA/NEJ (Se uppmärksamhetsinformation i Melior)		
Registrera i Melior och Elvis		
Se om upprättad vårdplan finns (se under fri aktivitet) och flytta denna till aktuellt vårdtillfälle		
ID-band och sängmärkning		
Välkomstbroschyr		
Kontrollera att journalen är komplett: svar blodgrupp, crossmatch i CDC och FC		
PVK och provtagning enligt lista nedan. OBS! Titrar! (PVK sätts för ev. ytterligare prover och ev intravenösa läkemedel preop)		
Ankomstsamtal enligt SBAR i Melior		
Riskbedömning TUF (Trycksår, Undernäring, Fall) samt upprätta plan vid identifierad risk		
Öppna/Uppdatera uppmärksamhetsinformation, patientbakgrund och tillägg till patientbakgrund i Melior (Fria aktiviteter)		
Längd och vikt		
NEWS-kontroller		
EKG		
Mät ut stödstrumpor		
Läkarundersökning/inskrivning/ordinationer av njurmedicinare (immunsuppression, antibiotikaproylax och analgetika)		
Samtal och sidomarkering kirurg		
Kontrollera att patienten har CDK alternativt AV-fistel		
Immunadsorbtionsbehandling (IA-behandling) nr 1 inplanerad		
IA-behandling nr 2 inplanerad		
IA-behandling nr 3 inplanerad		
IA-behandling nr 4 inplanerad		
IA-behandling nr 5 inplanerad		
IA-behandling nr 6 inplanerad		

Eventuella dialysbehandlingar inplanerade: _____		
CVK remiss (diabetiker, svårstuckna, induktion med thymoglobulin) endast på läkarordination. Skriv ut och skicka med till operation		
Narkosbedömning på preop center (mån-tor 9–11.15, 13–15.30, fre 9-11.15).		
Fysioterapeut preoperativ information		
Påbörja ”Vårdavdelning” i Orbit		
Förbered preoperativa läkemedel till operationsdagens morgon		
Ta fram ”Provtagning före och efter AB0-inkompatibel njurtransplantation, inläggning dag -3/dag -7”		
Beställ till avd 139: lunch _____ middag _____		
Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch kvällen före op.		

Operationsdagens morgon	Datum	Sign
Anti A eller anti B-titer (förprov) senast kl. 05:45 till blodcentralen Aktmärk. Lämna på blodcentralen tillsammans med rosa remiss transfusionsmedicin Svar INNAN donatorn åker till operation. Meddela svar till ansvarig njurmedicinare avd 139!		
Na, K, Krea senast kl. 05:45 till C-lab Aktmärk Rapportera omgående avvikande provsvar till ansvarig läkare		
NEWS-kontroller i samband med provtagning		
Avlägsna smycken, piercing, smink, nagellack, kontaktlinser		
Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch på morgonen		
Renbäddad säng med plast och draglakan		
Stödstrumpor, underbyxor och operationsskjorta på		
Dävert ska finnas på sängen vid transport till operation		
Kontrollera att patienten är fastande. Anteckna tiden för fasta i Orbit		
Vikt		
Kontrollera att sidomarkering finns		
Peritonealdialyspatient: Tappa ut dialysvätska i tompåse		
Fyll i dokument Patienttillhörigheter tillsammans med patienten (ett ex i patientpärm, ett ex i varje påse samt ett ex i pärm på expeditionen).		
Packa tillhörigheter i särskilt avsedda påsar, lås in i avsett förråd när patienten åker till op.		
Premedicinering enligt ordination (Melior och Orbit), ges på avdelningen 1 timma före operation		
Gör patienten klar i Orbit, signera och klarmarkera innan patienten skickas ner till operation		
Kontrollera läkemedelsmodulen och skicka med aktuella läkemedel till operation		

PROVTAGNING	Datum	Sign
<i>Patienter som ska ha IA-behandling: Skicka med provlappar till dialysen, så tar de proverna. Patienter som INTE ska ha IA-behandling: Prover tas på Transplantation Dagvård</i>		
Prover som lämnas till transfusionsmedicin		
Blodgruppering (om den inte tidigare är tagen på SU) (6 ml EDTA-rör) Rosa remiss transfusionsmedicin		
Bastest (6 ml EDTA-rör) Rosa remiss transfusionsmedicin		
Anti A titer <u>eller</u> Anti B titer Akutmärk (6 ml EDTA-rör) Rosa remiss transfusionsmedicin. Skriv på remiss och rör: Före ABO-behandling. Skriv på remiss och rör: Efter ABO-behandling.		
Provtagning labmodulen, lämnas på c-lab		
Hb, Lpk, Tpk		
Na, K, Krea, Ca, CRP, ASAT, ALAT, ALP, Bili, Alb, Urea OBS! läkarkontakt vid P-Kalium >5mmol/L		
PK, APTT		
Glukos, Standardbikarbonat		
Calciumjon Skriv på beställningen: Före ABO-behandling. Skriv på beställningen: Efter ABO-behandling.		
Provtagning RO SP, lämnas på c-lab		
Cytomegalovirus (CMV)-IgG (Serum) Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser -> sök analys		
Hepatit B s-Ag (HBSAG) (Serum) Hepatit C-ak (Serum) HIV 1+2 ak+ag (Serum) Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser -> sök analys		
Urin-odling (kastad) Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser -> sök analys		
Alla utlandspatienter samt patienter som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 12 månaderna screenodlas för MRB vid inskrivning enligt rutin: <i>Vårdhygien – Multiresistenta bakterier (MRB) screenodling av patienter.</i> MRB screening (Rectum) MRB screening (Perineum) MRB screening (Näsa) MRB screening (Svalg) I förekommande fall: sår, infarter, KAD osv Sökväg: välj mottagare klinisk mikrobiologi, under laboratoriets analyser -> sök analys		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Provtagning ROSP, lämnas i grå låda märkt med kliniska studier på avdelning 139		
Biobanksprovtagning: 9 ml i serumrör (rött) och 6ml i EDTA-rör (lila). OBS Tas ej från fredag kl 13 till söndag kl 10. Sökväg: välj <i>Biobank i väst</i> som mottagare, grupper-> Biobank TX		
Studieprover? (enl specifikt studie-PM)		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-195

Version: 37.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16