

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

Läkemedel - Diamox

LÄKEMEDELS- BESKRIVNING

Injektionssubstans i torrampull innehållande 500 mg.
Diamox innehåller acetazolamid som är en kolsyre-
anhydrashämmare.
Acetazolamid är ett sulfonamidderivat utan bakteriostatisk effekt.
Acetazolamids effekter är:
I njuren, befrämjar diuresen med förstärkt utsöndring av Na⁺, K⁺,
HCO₃⁻ och vatten.
I ögat, sänkning av intraokulärt tryck vid glaukom.
I centrala nervsystemet, gynnsam effekt vid hjärnödem och
epilepsi.
Preparatet har snabbt insättande effekt och utsöndras inom
24 timmar.

INDIKATION

Ödem av olika genes
Diuretikum vid alkalos
Glaucom

BIVERKNINGAR

Trötthet, yrsel, metabolisk acidosis.

KONTRAINDIKATIONER

Mb Addison, grav lever eller njurfunktionsnedsättning.
Överkänslighet mot sulfonamider.

SPÄDNING

Injektionsflaskans innehåll löses i 5 ml sterilt vatten.

DOSERING

500 mg x 1-4 efter behov och patientens syra-bas-status.

HÅLLBARHET

Färdigblandad lösning är hållbar i 12 timmar i rumstemperatur.

ADMINISTRATION

Långsam intravenös injektion, lösningen är alkalisk (pH 9) och
kan orsaka sveda och irritation i perifer ven.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1955

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15