

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

Läkemedel - Efedrin

LÄKEMEDELS BESKRIVNING	Efedrin, injektionsvätska, lösning 50 mg/ml.
INDIKATIONER	Blodtrycksfall vid generell, spinal- eller epiduralanestesi. Komplikationer/biverkningar av TEDA, blodtrycksfall. Bronkialastma.
KONTRAINDIKATIONER	Försiktighet vid cardioarterioskleros och tachykardi.
BIVERKNINGAR	Efedrin kan ge miktionssvårigheter och urinretention. För mer information hänvisas till FASS.
SPÄDNING	Vid intravenös administrering måste efedrin spädas! Efedrin® injektionsvätska 50 mg/ml: 1 ml späds med 9 ml NaCl till koncentrationen 5 mg/ml.
DOSERING	Intravenöst: Av den spädda lösningen (Efedrin® 5 mg/ml) ges 5-10 mg iv. Subcutant: Inj 25-50 mg (0,5-1 ml Efedrin 50 mg/ml). Effekten håller i ca 1 timma.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Postoperativ vård Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1957

Version: 13.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15