

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-04-22

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Giltig till: 2027-04-15

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Läkemedel - Nitroglycerin

| | |
|------------------------------|--|
| LÄKEMEDELSBESKRIVNING | Nitroglycerin® injektionsvätska 1 mg/ml, flaskor om 50 ml. Nitroglycerin ger en dilatation av kärlbädden, något mer uttalad på den venösa än på den arteriella sidan. Detta ger en pre- och afterloadreduktion med minskat syrgasbehov i myokardiet som följd. Nitroglycerin kan även ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. |
| INDIKATIONER | Myokardischemi, hjärtsvikt, blodtrycksreglering och postoperativt efter att arteria radialis har använts som graft vid ACB-operation. |
| BIVERKNINGAR | De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, yrsel, hypotoni, takykardi samt flush. |
| SPÄDNING | Ges vanligtvis outspädd men kan spädas med NaCl 0.9% eller Glukos 5% om svagare koncentration önskas. |
| DOSERING | 0.25-2.5 µg/kg/min. |
| ADMINISTRERING | Infunderas intravenöst via sprut- eller volympump. |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Anestesi 1 och 2
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1977

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15