

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi  
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare  
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

## Läkemedel - NovoSeven

<b>LÄKEMEDELS-</b>	NovoSeven innehåller aktiverad rekombinant koagulationsfaktor VII.
<b>BESKRIVNING</b>	Verkningsmekanismen omfattar bindning av faktor VIIa till exponerad vävnadsfaktor. Detta komplex aktiverar faktor IX till faktor IXa och faktor X till faktor Xa, vilket initierar omvandlingen av små mängder protrombin till trombin. Trombin leder till aktivering av trombocyter och faktor V och VIII på skadestället, vilket i sin tur leder till att koagel bildas genom omvandling av fibrinogen till fibrin. Preparatet finns i styrkan 1, 2 och 5 mg.
<b>INDIKATIONER</b>	På TIVA: Postoperativ blödning
<b>BIVERKNINGAR</b>	Biverkningar är sällsynta.
<b>DOSERING</b>	Enligt ordination. Rekommenderad startdos är 90 µg/kg.
<b>FÖRVARING</b>	Novoseven förvaras i rumstemperatur
<b>BLANDBARHET/ ADMINISTRERING</b>	Bered lösningen och administrera den som intravenös bolusinjektion under 2-5 minuter. NovoSeven ska ej blandas med infusionslösningar eller ges i form av dropp.
<b>HÅLLBARHET</b>	Beredd lösning bör används omedelbart, men kan förvaras i rumstemperatur i 6h och i kylskåp upp till 24h. Detta rekommenderas dock inte p.g.a. ökad infektionsrisk.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1981

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-04-22

**Giltig till:** 2027-04-15