

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi  
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare  
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

## Läkemedel - Octostim

<b>LÄKEMEDELS- BESKRIVNING</b>	Faktor VIII-frisättare, Vasopressin. Octostim intravenöst eller subcutant leder till att halten av faktor-VIII koagulationsaktivitet i plasma ökar. Även halten av von Willebrand faktor-antigen ökar.
<b>INDIKATIONER</b>	Postoperativ blödning
<b>BIVERKNINGAR</b>	Octostim är analog med ADH. Kan därför ge minskade diuresmängder. Övergående blodtryckssänkning med reflektorisk takykardi och ansiktsrodnad vid administreringstillfället.
<b>DOSERING</b>	15-30 µg Octostim enligt ordination.
<b>BLANDBARHET/ ADMINISTRERING</b>	Octostim späds med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml och ges som intravenös infusion under 15-30 minuter.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1983

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-04-22

**Giltig till:** 2027-04-15