

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Central intensivvårdsavdelning

Giltig från: 2025-04-22

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Giltig till: 2027-04-15

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Läkemedel - Saltsyra

LÄKEMEDELS- BESKRIVNING

Stamlösning HCL 1 mmol/ml.

INDIKATIONER

Ges mot grav metabolisk alkalos där tillförsel av ammoniumklorid ej är tillräcklig.

SPÄDNING

• 100 mmol HCL (=100 ml) späds i 400 ml (dra ur 100 ml)
Glucos 5% eller Natriumklorid 9 mg/ml = 0,2 mmol/ml.

DOSERING

Max 0,2 mmol/kg/h eller 15-20 mmol/h d.v.s.
max hastighet är patientens vikt i kilo/h, men ej över 75 - 100 ml/h

BLANDBARHET/ ADMINISTRERING

HCL blandas alltid i plastpåsar *ej i glasflaska!* HCL infunderas endast via CVK med spetsen i vena cava superior, absolut inte i en PVK! Kontrollera att du har ett bra backflöde i den centrala venkatetern innan infusionen startas.

HCL får ej gå tillsammans med andra lösningar utan infunderas som enda läkemedel i CVK.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Central intensivvårdsavdelning

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1986

Version: 11.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15