

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

## Preoperativa förberedelser vid njurtransplantation (levande donator)

Senast dagen före operation	Datum	Sign
Ingår patienten i en studie? JA/NEJ (Se uppmärksamhetsinformation i Melior)		
Registrera i Melior och Elvis		
Se om upprättad vårdplan finns (se under fri aktivitet) och flytta denna till aktuellt vårdtillfälle		
ID-band och sängmärkning		
Välkomstbroschyr		
Kontrollera att journalen är komplett: svar blodgrupp och crossmatch i CDC och FC		
PVK och provtagning enligt lista nedan (PVK sätts för ev. ytterligare prover och ev intravenösa läkemedel preop)		
Ankomstsamtal enligt SBAR i Melior		
Riskbedömning TUF (Trycksår, Undernäring, Fall) och upprätta plan vid identifierad risk		
Öppna/Uppdatera uppmärksamhetsinformation, patientbakgrund och tillägg till patientbakgrund i Melior (Fria aktiviteter)		
Är patient utomlandsvårdad senaste året? Om ja: se provtagning MRB		
Längd och vikt		
NEWS-kontroller		
EKG		
Mät ut stödstrumpor		
Läkarundersökning/inskrivning/ordinationer av nefrolog (immunsuppression, antibiotikaproylax och analgetika)		
Samtal och sidomarkering kirurg		
Eventuella dialysbehandlingar inplanerade: _____ _		
CVK remiss (diabetiker, svårstuckna, induktion med thymoglobuline), endast på läkarordination. Skriv ut och skicka med till operation		
Narkosbedömning på preop center (mån-tor 9–11.15, 13–15.30, fre 9-11.15)		
Fysioterapeut preoperativ information		
Påbörja ”Vårdavdelning” i Orbit		
Dela preoperativa läkemedel till operationsdagens morgon		
Avlägsna ev smycken, piercing, smink, nagellack, kontaktlinser		

Rubrik: Preoperativa förberedelser vid njurtransplantation (levande donator)

Dokument-ID: SU9805-1593997-200

Version: 30.0

Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch kvällen före op.		
<b>Operationsdagens morgon</b>		
Na, K, Krea (senast kl 05.45) <i>Akutmärk.</i> <b>Rapportera omgående avvikande provsvar till ansvarig läkare.</b>		
NEWS-kontroller i samband med provtagning		
Avlägsna ev smycken, piercing, smink, nagellack, kontaktlinser		
Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch på morgonen		
Renbäddad säng med plast och draglakan		
Stödstrumpor, underbyxor och operationsskjorta på		
Dävert ska finnas på sängen vid transport till operation		
Kontrollera att patienten är fastande. Anteckna tiden för fasta i Orbit		
Vikt		
Kontrollera att sidomarkering finns		
Peritonealdialyspatient: Tappa ut dialysvätska i tom påse		
Fyll i dokument Patienttillhörigheter tillsammans med patienten (ett ex i patientpärm, ett ex i varje påse samt ett ex i pärm på expeditionen).		
Packa tillhörigheter i särskilt avsedda påsar, lås in i avsett förråd när patienten åker till op.		
Gör patienten klar i Orbit, signera och klarmarkera innan patienten skickas ner till operation		
Kontrollera läkemedelsmodulen och skicka med aktuella läkemedel till operation		

<b>PROVTAGNING</b>	<b>Datum</b>	<b>Sign</b>
<b>Prover som lämnas till transfusionsmedicin</b>		

Blodgruppering (om den inte tidigare är tagen på SU) (6 ml EDTA-rör) Rosa remiss transfusionsmedicin		
Bastest (6 ml EDTA-rör) Rosa remiss transfusionsmedicin		
<b>Provtagning labmodulen, lämnas på c-lab</b>		
Hb, LPK, TPK		
Na, K, Krea, Ca, CRP, ASAT, ALAT, ALP, Bili, Prot, Alb, Urea		
PK, APTT		
Glukos, Standardbikarbonat		
<b>Provtagning ROSP, lämnas på c-lab</b>		
Cytomegalovirus (CMV)-IgG (Serum)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
Hepatit B s-Ag (HBSAG) (Serum) Hepatit C-ak (Serum) HIV 1+2 ak+ag (Serum)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
Urin-odling (kastad)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
<b>Alla</b> utlandspatienter samt patienter som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 12 månaderna screenodlas MRB vid inskrivning enligt rutin: <i>Vårdhygien – Multiresistenta bakterier (MRB) screenodling av patienter</i>		
MRB screening (Rectum) MRB screening (Perineum) MRB screening (Näsa) MRB screening (Svalg) I förekommande fall: sår, infarter, KAD osv		
Sökväg: välj mottagare klinisk mikrobiologi, under laboratoriets analyser → sök analys		
<b>Provtagning ROSP, lämnas i grå låda märkt med kliniska studier på avdelning 139</b>		
Biobanksprovtagning: 9 ml i serumrör (rött) och 6ml i EDTArör (lila).		
OBS Tas ej från fredag kl 13 till söndag kl 10.		
Sökväg: välj <i>Biobank i väst</i> som mottagare, grupper-> Biobank TX		
Studieprover? (enl specifikt studie-PM)		

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Transplantationscentrum

**Innehållsansvar:** Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

**Godkänd av:** Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-200

**Version:** 30.0

**Giltig från:** 2026-01-16

**Giltig till:** 2028-01-16