

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2026-05-07

Innehållsansvar: Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1), Överläkare

Giltig till: 2028-05-07

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Preoperativa förberedelser vid visceral transplantation

Åtgärd	Datum	Sign
Ingår patienten i en studie? JA/NEJ (Se uppmärksamhetsinformation i Melior)		
Registrera i Melior och Elvis		
Se om upprättad vårdplan finns (se under fri aktivitet) och flytta denna till aktuellt vårdtillfälle		
ID-band och sängmärkning		
Välkomstbroschyr		
Kontrollera att aktuell blodgrupp finns, om inte se provtagning		
PVK + provtagning, se nedan		
Ankomstsamtal, enligt SBAR, i Melior		
Riskbedömning TUF (Trycksår, undernäring, fall) och upprätta plan vid identifierad risk		
Öppna/Uppdatera uppmärksamhetsinformation, patientbakgrund och tillägg till patientbakgrund i Melior		
Är patienten utomlandsvårdad senaste året? Om ja: se provtagning MRB		
Om utlandspatient meddela SIC på tel: 26803 eller 26804 (vardagar dagtid). På jourtid kontaktas Ágúst på tel: 0702-86 39 69, <u>endast om patienten är från Island.</u>		
Kontrollera att patienten är fastande. Anteckna tid för fasta i Orbit		
Längd och vikt (skriv in i Melior och i Orbit)		
NEWS-kontroller		
EKG		
Ta fram benmanschetter för aktiv kompression (pump skickas ej med)		
Kontrollera att det finns markerad lämplig plats för stomi		
Hjärt-lungröntgen med preliminärsvär (skriv remiss i KLFYS-RTG Remiss, finns under externa program)		
Läkarundersökning/Inskrivning		

Rapportera avvikande provsvar till kirurg		
Avlägsna smycken, piercing, smink, nagellack, kontaktlinser		
Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch		
Renbäddad säng med plast och draglakan		
Operationsskjorta, underbyxor och benmanschetter på		
Fyll i dokument Patienttillhörigheter tillsammans med patienten (ett ex i patientpärm, ett ex i varje påse samt ett ex i pärm på expeditionen).		
Packa tillhörigheter i särskilt avsedda påsar, lås in i avsett förråd när patienten åker till op.		
Meddela operation när patienten är klar, tel 28111		
Premedicinering enligt ordination (Melior och Orbit)		
Gör patienten klar i Orbit, signera och klarmarkera innan patienten skickas ner till operation		
Kontrollera läkemedelsmodulen och skicka med aktuella läkemedel till operation		
Bengmarkssond för enteral nutrition medskickas till operation		

Provtagning	Datum	Sign
Prover som lämnas till transfusionsmedicin		
Blodgruppering (om den inte tidigare är tagen på SU) (6 ml EDTA-rör) <i>Rosa remiss transfusionsmedicin</i>		
Bastest, beställ 10 enheter blod (6 ml EDTA-rör) <i>Rosa remiss transfusionsmedicin</i>		
HLA-typning (6ml EDTA-rör) DSA (Donator Specifika Antikroppar) (6ml EDTA-rör) Panelreaktiva HLA-antikroppar (PRA) (6 ml EDTA-rör) <i>Remiss Immunologisk utredning transplantation/donation solida organ</i>		
Provtagning labmodulen, lämnas på c-lab		
Hb, Lpk, Tpk akutmärk		
Na, K, Ca, Krea, CRP, ASAT, ALAT, Alp, Bil, Prot, Alb, Urea akutmärk		
APTT, PK, Fibrinogen akutmärk		
Glukos akutmärk		
Provtagning ROSP, lämnas på c-lab		
Cytomegalovirus (CMV)-IgG (Serum)		
Sökväg: Välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		

<p>Om ingen känd virushepatit Hepatit B s-Ag (HBSAG) (Serum) Hepatit C-ak (Serum) HIV 1+2 ak+Ag (Serum)</p> <p>Sökväg: Välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys</p>		
<p>Om positiv Hepatit B Hepatit C-ak (Serum) HIV 1+2 ak+Ag (Serum) Hepatit B-DNA (Serum)</p> <p>Sökväg: Välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys</p>		
<p>Om positiv Hepatit C Hepatit B s-Ag (HBSAG) (Serum) HIV 1+2 ak+Ag (Serum) Hepatit C-RNA (Serum)</p> <p>Sökväg: Välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys</p>		
<p>Urin-odling (kastad)</p> <p>Sökväg: välj mottagare klinisk mikrobiologi, under laboratoriets analyser → sök analys</p>		
<p>Alla utlandspatienter samt patienter som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 12 månaderna screenodlas MRB vid inskrivning enligt rutin: <i>Vårdhygien – Multiresistenta bakterier (MRB) screenodling av patienter</i></p> <p>MRB screening (Rectum) MRB screening (Perineum) MRB screening (Näsa) MRB screening (Svalg)</p> <p>I förekommande fall: sår, infarter, KAD osv</p> <p>Sökväg: välj mottagare klinisk mikrobiologi, under laboratoriets analyser → sök analys</p>		
<p>Provtagning ROSP, lämnas i grå låda märkt med kliniska studier på avdelning 139</p>		
<p>Biobanksprovtagning:</p> <p>10ml Serumrör (rött) 7ml EDTA-rör (lila) 7ml urin Fecesprov</p> <p>OBS Tas ej från fredag kl 13 till söndag kl 10.</p> <p>Sökväg: välj <i>Biobank i väst</i> som mottagare, under laboratoriets analyser -> PTXL multivisceral och PTXL multivisceral feces.</p> <p>Observera att feces-prov läggs i transporthylsa innan det läggs i grå låda.</p>		
<p>Studieprover? Enligt specifikt PM</p>		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1),
Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-201

Version: 7.0

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-07