

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi  
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare  
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-27

# Transplantation, Everolimus- Certican®

## Revideringar sedan föregående version

Inga revideringar är gjorda.

## Läkemedelsbeskrivning

Tablett 0,25mg, 0,5mg, 0,75mg. Dessa får inte krossas.

Dispergerbar tablett 0,1mg, 0,25mg vilka löses upp i vatten och ges i sond.

Immunosuppression. Aktiv substans: Everolimus: Certican®. Hämmar proliferationen av bl.a. T-lymfocyter. Hämmar effekten av tillväxtfaktorer generellt.

## Indikation

Förebygga avstötning efter organtransplantation speciellt vid försämrad njurfunktion. Kan kombineras med lågdos cyclosporin/takrolimus.

## Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är afte (blåsor i munnen), akne, hyperlipidemi, ödem, bakteriella infektioner och pneumonit. Var god se FASS.

## Dosering

Dygnsdosen per os delas vanligtvis upp i två doser med 12 timmars mellanrum, kl. 10.00 och kl. 22.00.

## Hantering

Certican tillhör gruppen ”Särskilt farliga läkemedel”.

## Iordningställande

Använd sked vid hantering. Tabletter får inte krossa, använd dispergerbar tablett vid administrering via v-sond.

## Administrering

Undvik att ta i tablettarna med fingrarna. Använd handskar.

Vid administrering i ventrikelsond ska handskar och skyddsglasögon användas när risk för stänk föreligger.

## Administrering via sond

Använd dispergerbara tabletter. Se till att all läkemedel når patienten genom att skölja medicinbägare flera gånger och spöla igenom sonden med vatten. När mixtur Sandimmun ges via sond ska det tillföras före Certican. Dessa läkemedel får inte blandas.

## Åtgärder vid spill

Vid spill på oskyddad hud, skölj rikligt med vatten.

Vid stänk i ögon, skölj genast med rinnande vatten eller ögonspolflaska.

## Koncentrationsprov

Koncentrationsprov vid ordination, på morgonen, kl.08.30 då provet ska vara på laboratoriet före kl. 09.00. För närvarande sker analys på Klinisk kemi måndag, tisdag och torsdag. Svar utlämnas dagen efter.

EDTA-rör märkt Everolimus-koncentration.

## Referenser

[FASS.](#)

[PM Läkemedel med arbetsmiljörisker Riktlinjer för TIVA.](#)

## Arbetsgrupp/Granskare

Ann-Christine Erlandsson; IVA-sjuksköterska

Anna Lundberg; IVA-sjuksköterska

Petra Sahlman; undersköterska

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2136

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-03-31

**Giltig till:** 2027-03-27