

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2024-10-03

Innehållsansvar: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-10-03

Granskad av: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Augumenationsplastik, Op

Revidering i denna version

Version 2

Arbetsbeskrivning

GALLER

Protesgaller

Ljushake

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Svarta dukar eller röda dukar

Engångsdiatermi med förlängning

Implantat (kolla om det finns några förbeställda).

Ev provprotes

OP LÄGE

Ryggläge

HUDESINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armarna.

SUTURER

3-0 Monocyl

4-0 Monocryl.

Ev 2-0 Novafil vid ev drän

Gennaro

3-0 Vicryl

3-0 Monocryl

HUDEFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur

LÄKEMEDEL

0.5% Carbocain med adrenalin blandas med NaCl för injektion till styrkan 0,25 %.

UTRUSTNING

Monopolär diatermi.

Ljuskälla.

FÖRBAND

Steristrip

Fluff och BH

Ev Bröstband.

DRÄNAGE

Ev 14 ch aktivt dränage, markeras enligt pm.

INDIKATION

Brösthypoplasi eller malformitet på ett eller bägge brösten.

METOD

Kirurgen ritar med märkpena . O, 25 % Carbocain med adrenalin injiceras. Kirurgen dissekerar sig fram så att en ”ficka” skapas där det är rätt läge för protesen. Protesen läggs in. Såret sutureras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Granskad av: Ulrika Johansson, (ulrjo22), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2307

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-03

Giltig till: 2026-10-03