

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2024-08-27

Innehållsansvar: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-08-26

Granskad av: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Pectus excavatum

Förändringar sedan föregående version

Arbestbeskrivning

GALLER

Protesgaller.

Ljushake.

ÖVRIGT

Bröst/buk set

Röda kompresser.

Engångsdiatermi med förlängning.

OP LÄGE

Ryggläge

HUDDÉSINFEKTION

Klorhexidinsprit 5mg/ml.

STERIL DRAPERING

Fyrfält med mediumlakan över armen.

SUTURER

2/0 Novafil (till drän).

3/0 Monocryl

4/0 Monocryl.

HUDFÖRSLUTNING

Fortlöpande resorberbar sutur

LÄKEMEDEL

0.5% Carbocain med adrenalin blandas med NaCl för injektion till styrkan 0,25 %.

UTRUSTNING

Monopolär diatermi.

Ljuskälla.

DRÄNAGE

Ev:14 ch.

FÖRBAND

Steril häfta

Ev. dränförband

Kompresser och gördel.

INDIKATION

Medfödd missbildning i bröstkorgen.

METOD

Kirurgen ritar och injicerar Carbocain-adrenalin. En proteshåla fridissekeras och den formgjutna siliconprotesen appliceras på rätt plats. Dränage läggs in och operationssåret sutureras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Granskad av: Ingmarie Fredborg, (ingfr42), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2345

Version: 2.0

Giltig från: 2024-08-27

Giltig till: 2026-08-26