

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-02-19

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Giltig till: 2027-02-19

Granskad av: Camilla Blixt, (camb12), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Vulvaresektion, vulvektomi - Anestesirutin

## Förändringar sedan föregående version

Modifiering av Fentanyls dos vid spinalanestesi och Oxykodons dos i premedicinering.

Komplettering med länken till Preoperativ bedömning rutin.

Upplägg enligt nya operationsborden.

## Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår vulvaresektion eller vulvektomi (+ ev. lymfkörtelutrymning).

## Arbetsbeskrivning

### Anestesimetod:

- Första val: LMA, Propofol/Remifentanil TCI  
Lokalbedövning läggs av operatör i operationsområdet.
- Om spinal anestesi på medicinsk bas bör prioriteras: Spinal tung (Marcain spinal tung 0,5 % eller Takipril 2%) ± Fentanyl 10–15 µg
- Morfin intratekalt som postoperativ smärtlindring kan bara övervägas när man planerar en omfattande kirurgi med ev. lymfkörtelutrymning eller lambåinläggning. I dessa fall krävs tät kommunikation med operatören. Morfin intratekalt kan kombineras med båda former av anestesi (vgs. [Neuraxiala opioider - Anestesirutin](#))

## Premedicinering

Tabl. Oxycontin 5-10 mg

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg

PONV profylax, till exempel: Tabl. Betapred 4–8 mg, Tabl. Ondansteron 8 mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

## Positionering

Standardbord med stövlar, även vid lymfkörtelutrymning. Patienten ska ligga långt ner på bordet. Bägge armar utåt på armbord.

## Operationstid

Från några minuter till flera timmar, rådfråga operatör vid oklarheter.

## Operationsbeskrivning

Bortopererande av yttre genitalia, dvs. delar av yttre och inre blygdläppar, mellangården, urinrörsmynningen och clitorisområdet, varefter sårytorna vanligtvis sutureras men kan även lämnas öppna. KAD under ingreppet beror på omfattningen av resektionen.

Om lymfkörtelutrymning planeras bör man räkna med längre operationstid. Blue Patenté 2,5% (Patent blue eller Patent blått) används för att lättare hitta sentinel nodes. Det är ett triarylmetanfärgämne som är känt bland annat för att det kan ge allergiska reaktioner och för att det missfärgar patientens hud och urin under första dygnet efter operationen.

## Allmänna synpunkter

**Trombosprofylax:** ev. enligt Melior.

**Antibiotikaproylax:** enligt Melior.

## Postoperativt

Postoperativt kan de flesta patienterna smärtlindras effektivt med intravenösa preparat: Paracetamol, Oxycodon och Catapressan.

## Granskare

Camilla Blixt, Instruktor, Anestesisjuksköterska Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Marie Melander, Sektionsledare Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 4 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

**Granskad av:** Camilla Blixt, (cambl2), Instruktör

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2467

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-02-19

**Giltig till:** 2027-02-19