

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Preoperativa förberedelser vid transplantation av njure-pankreas eller singelpankreas

Vid inläggning	Datum	Sign
Ingår patienten i en studie? JA/NEJ (Se uppmärksamhetsinformation i Melior)		
Registrera i Melior och Elvis		
Se om upprättad vårdplan finns (se under fri aktivitet) och flytta denna till aktuellt vårdtillfälle		
ID-band och sängmärkning		
Välkomstbroschyr		
Kontrollera att aktuell blodgrupp finns, om inte se provtagning		
PVK och provtagning enligt lista nedan (PVK sätts för ev. ytterligare prover och ev intravenösa läkemedel preop)		
Ankomstsamtal enligt SBAR i Melior		
Riskbedömning TUF (Trycksår, Undernäring, Fall) och upprätta plan vid identifierad risk		
Öppna/Uppdatera uppmärksamhetsinformation, patientbakgrund och tillägg till patientbakgrund i Melior (Fria aktiviteter)		
Om utlandspatient meddela SICAB på tel: 26803 eller 26804 (vardagar dagtid). På jourtid kontaktas Áugúst på tel: 0702-86 39 69, <u>endast om patienten är från Island.</u>		
Kontrollera att patienten är fastande. Anteckna tiden för fasta i Orbit		
Längd och vikt (dokumentera i mätvärden <u>och</u> i Orbit)		
NEWS-kontroller		
EKG		
Mät ut stödstrumpor		
Läkarundersökning/inskrivning/ordinationer (immunsuppression, antibiotikaproylax och analgetika)		
Samtal och <u>sidomarkering</u> kirurgläkare		
Rapportera omgående avvikande provsvar till ansvarig läkare (Läkarkontakt vid P-Kalium > 5mmol/L)		
OBS! Om patienten får preoperativ hemodialys, skicka med etikett för provtagning "efter dialysen": K, Krea Akutmärk (Läkarkontakt vid P-Kalium > 5mmol/L)		
CVK remiss, skriv ut och skicka med till operation		

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ta emot uppgift om svar på crossmatch i CDC (meddelas av organkoordinator) OBS! NEGATIV crossmatch i CDC är förutsättning för transplantation!		
Fysioterapeut preoperativ information (om dagtid)		
Peritonealdialyspatient: Tappa ut dialysvätska i tompåse		
Avlägsna smycken, piercing, smink, nagellack och kontaktlinser		
Preoperativ dubbeldusch med Descutan®. En dubbeldusch		
Renbäddad säng med plast och draglakan		
Operationsskjorta, underbyxor och stödstrumpor på		
Fyll i dokument Patienttillhörigheter tillsammans med patienten (ett ex i patientpärm, ett ex i varje påse samt ett ex i pärm på expeditionen).		
Packa tillhörigheter i särskilt avsedda påsar, lås in i avsett förråd när patienten åker till operation		
Dävert ska finnas på sängen vid transport till operation		
Kontrollera att sidomarkering finns		
Meddela operation när patienten är klar, tel 28111		
Gör patienten klar i Orbit, signera innan patienten skickas ner till op.		
Premedicinering enligt ordination (Melior och Orbit), ges på avdelningen ca 1 timma före operation		
Kontrollera läkemedelsmodulen och skicka med aktuella läkemedel till operation		
Skicka med EDA-pump till operation		

Provtagning	Datum	Sign
--------------------	--------------	-------------

2 (3)

Prover som lämnas till transfusionsmedicin		
Blodgruppering (om den inte tidigare är tagen på SU) (6 ml EDTA-rör) <i>Rosa remiss transfusionsmedicin</i>		
Bastest (6 ml EDTA-rör) <i>Rosa remiss transfusionsmedicin</i>		
HLA-antikroppar (6 ml EDTA-rör) <i>Remiss Immunologisk utredning transplantation/donation solida organ, kryssa i HLA-antikroppar</i>		
Provtagning labmodulen, lämnas på c-lab		
Hb, Lpk, Tpk <i>Akutmärk</i>		
Na, K, Ca, Krea, CRP, ASAT, ALAT, ALP, Bili, Alb, Urea, Amylas pankreas <i>Akutmärk</i>		
PK, APTT <i>Akutmärk</i>		
Glukos, Standardbikarbonat <i>Akutmärk</i>		
HbA1c		
Provtagning ROSP, lämnas på c-lab		
Cytomegalovirus (CMV)-IgG (Serum)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
Hepatit B s-Ag (HBSAG) (Serum) Hepatit C-ak (Serum) HIV 1+2 ak+ag (Serum)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
Urin-odling (kastad)		
Sökväg: välj klinisk mikrobiologi som mottagare, under laboratoriets analyser → sök analys		
Alla utlandspatienter samt patienter som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 12 månaderna screenodlas MRB vid inskrivning enligt rutin: <i>Vårdhygien – Multiresistenta bakterier (MRB) screenodling av patienter</i>		
MRB screening (Rectum) MRB screening (Perineum) MRB screening (Näsa) MRB screening (Svalg)		
I förekommande fall: sår, infarter, KAD osv		
Sökväg: välj mottagare klinisk mikrobiologi, under laboratoriets analyser → sök analys		
Provtagning ROSP, lämnas i grå låda märkt med kliniska studier på avdelning 139		
Biobanksprovtagning: 9 ml i serumrör (rött) och 6ml i EDTA rör (lila).		
OBS Tas ej från fredag kl 13 till söndag kl 10.		
Sökväg: välj <i>Biobank i väst</i> som mottagare, grupper → Biobank TX		
Studieprover? (enl specifikt studie-PM)		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ellen Berntsson, (ellba1), Sektionsledare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2568

Version: 6.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16