

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-09

# Esofagoskopi OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp.*

## Patient/Indikation

Dysfagi, Främmande kropp, Zenkedivertikel, Stenos, Malignitetsutredning med ultraljud, dilatation vid förträngningar. Både stelt och flexibelt esofagoskop kan användas.

**Op. tid <60 min**

## Premedicinering

**INGEN** peroral premedicinering.

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib ges i.v perop.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

## Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Flexibel skopi kan ofta utföras i LA med sedering.

Intravenös anestesi TCI; Propofol + Remifentanil + BIS/Sedline. Muskelrelaxation ges vid användning av stelt skop samt vid dilatation. Lidokainspray 4% i larynx.

## Luftväg

Oralintubation, tuben fästs i vänster mungipa.

## Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

## Positionering

Ryggläge med sänkt huvudplatta enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

## Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h  
Däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp.

[Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

## KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD om operationstid <2h. Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN  
[Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#). Tappning (om aktuellt) utförs enl.

RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#).

## Postoperativ smärtbehandling

Ev. Oxikodon och/eller Klonidin.

## Postop

UVA <1–2 h

Vid användning av stelt esofagoskop och/eller dilatation ska CRP och LPK tas postoperativt

på avdelningen. Fråga operatör om patienten ska vara fastande efter ingreppet.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2804

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-03-12

**Giltig till:** 2028-03-09