

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-30

Giltig till: 2026-06-27

Artroskopi i knä, armbåge, hand, fotled. Pre- och postoperativ smärtlindring

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar efter revidering 2024-06-05.

Bakgrund och syfte

Standardiserat omhändertagande av patienter som genomgår artroskopiska operationer i knä, armbåge, hand och fotled.

Utförande

Pre- och postoperativ smärtlindring vid ortopedisk, dagkirurgisk operation.

Artroskopi knä

Premedicinering:

- T. Paracetamol 1 g
- T. Arcoxia 60-90-120 mg (dos efter patientens vikt)
- T. Oxycontin 5–10 mg
- T. Postafen 25 mg

Anestesi:

1. Larynxmask TIVA: Propofol, Remifentanyl, Betametason
2. Spinal

Blockad: *endast* i samråd mellan anestesilog och operatör.

Smärtlindring: 30–45 min innan väckning ges inj Oxycodon enl narkosläkarens ordination.

Lokalanestesi: I slutet av operationen lägger operatör Narop 5 mg/ml, 20 ml intraartikulärt. Dosjustering görs om patienten väger under 60 kg och om patienten fått en blockad.

Artroskopi armbåge

Premedicinering:

- T. Paracetamol 1 g
- T. Arcoxia 60-90-120 mg (dos efter patientens vikt)
- T. Oxycontin 5–10 mg
- T. Postafen 25 mg

Anestesi:

1. Larynxmask TIVA: Propofol, Remifentanil, Betametason

Blockad: *endast* i samråd mellan anesthesiolog och operatör.

Smärtlindring: 30–45 min innan väckning ges inj Oxycodon enl narkosläkares ordination.

Lokalanestesi: I slutet av operationen lägger operatör Narop 5 mg/ml, totalt 20 ml. Dosjustering görs om patienten väger under 60 kg och om patienten fått en blockad.

Artroskopi hand

Premedicinering:

- T. Paracetamol 1 g
- T. Arcoxia 60-90-120 mg (dos efter patientens vikt)
- T. Oxycontin 5–10 mg
- T. Postafen 25 mg

Anestesi:

1. Larynxmask TIVA: Propofol, Remifentanil, Betametason

Blockad: *endast* i samråd mellan anesthesiolog och operatör.

Smärtlindring: 30–45 min innan väckning ges inj Oxycodon enl narkosläkares ordination.

Lokalanestesi: I slutet av operationen lägger operatör Narop 5 mg/ml, totalt 10 ml. Dosjustering görs om patienten väger under 60 kg och om patienten fått en blockad.

Artroskopi fot

Premedicinering:

- T. Paracetamol 1 g
- T. Arcoxia 60-90-120 mg (dos efter patientens vikt)
- T. Oxycontin 5–10 mg
- T. Postafen 25 mg

Anestesi:

1. Larynxmask TIVA: Propofol, Remifentanil, Betametason
2. Spinal

Blockad: *endast* i samråd mellan anesthesiolog och operatör.

Smärtlindring: 30–45 min innan väckning ges inj Oxycodon enl narkosläkarens ordination.

Lokalanestesi: I slutet av operationen lägger operatör Narop 5 mg/ml, avslutar med 10–20 ml. Dosjustering görs om patienten väger under 60 kg och om patienten fått en blockad.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar

VEC och VÖL ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs.

Arbetsgrupp

Bodil Dalqvist, funktionsansvarig Operation 3, Område 3

Katarina Helander Nilsson, överläkare Ortopedi, Område 3

Vladislav Gordins, sektionschef Ortopedi, Område 3.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-285

Version: 11.0

Giltig från: 2024-06-30

Giltig till: 2026-06-27