

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-06-08

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-06-08

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26), Operationssjuksköterska

Granskad av: Luaay Aziz, (luaaz2), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Hemiglossektomi OP 7 (OP)

Indikation

Tumör på tungan.

Operationsläge

Rygg, planläge.

Plocklista

Medicinteknisk apparatur

- Diatermi
- Ev. Pannlampa

Sterilcentralen

- Mungaller
- ENT-set
- Operationsrockar

Sterilförrådet

- Lamphandtag
- Monopolär diatermi med böjd diaterminål

Läkemedel/vätskor

- Etanol 70%
- NaCl 0,9% 1000ml
- Ev. Väteperoxid 15mg/ml

Operationssalen

- Secudrape (tusenlapp)
- 3-0 eller 4-0 Vicryl SH
- 2-0 eller 0 Ethilon FS-2 om hållsutur i tungan

Övrigt

- Ev. Hemopatch – kirurgens val
- Ev. Tandborste att göra rent i munnen efter operationen, motverkar postoperativt illamående

Sterildrapering

Tvätta med Etanol 70% från överläppen till strax nedanför mandibeln samt ner på sidorna mot öronen. Sätt en secudrape på överläppen ner över kinderna så den ligger bak mot pannan. Sätt ett u-lakan på mandibeln och fäst slitsarna på sidorna av ansiktet (ovanför öronen). Handduk med klister upptill på huvudet.



Metod

Hållsutur genom tungans medellinje, alternativt tunghållare, för att dra ut tungan och underlätta åtkomst. Resektionsgränserna markeras kring tumören med monopolär diatermi och därefter extirperas tumören med samma instrument. Vid behov suturligatur på A. Lingualis. Preparatet nålas på korkplatta för orientering. Munnen sköljes med väteperoxid och NaCl. Såret minskas sedan genom att kanterna kring det sys in med Vicryl. Kirurgen väljer ibland att sätta Hemopatch för att skydda den kvarvarande råa sårytan.

Övrigt

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering på grund av ny layout i SOFIA-STY.

Metodkortets syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Arbetsgrupp

- Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, AnOpIVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Luaay Aziz, Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marlene Darell, (marbl26),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Luaay Aziz, (luaaz2), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2854

Version: 3.0

Giltig från: 2026-06-08

Giltig till: 2028-06-08