

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (camlb2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19

Uretärimplantation - Anestesirutin

Förändringar sedan föregående version

Komplettering med länkar till Neuraxiala opioider, PONV och Preoperativ bedömning rutiner. BIS/Sedline i utrustningar.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår uretärimplantation.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod

Intubation, Sevoflurane/Fentanyl+”Morfin-spinal”

(Vgs.rutinen [Neuraxiala opioider](#))

Vid hög risk för PONV vgs. [PONV profylax, postoperativt illamående och kräkning - anestesirutin](#)

Premedicinering

Tabl. Oxycontin 0,1–0,2 mg/kg (max 15 mg)

Tabl. Alvedon 1g

Tabl. Arcoxia 120 mg

PONV profylax: Tabl. Betapred 4–8 mg, Tabl. Ondansteron 8 mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

Operationstid 3–5 timmar

Operationsbeskrivning

Öppen kirurgi, nedre medellinjesnitt. Denna operation görs om det finns någon form av skada eller striktur på uretären som måste åtgärdas och uretären sys sedan på urinblåsan igen (eller till urostomin).

Speciell utrustning

- artärnål
- 3 grova infarter (minst 18G 1,3 mm, en av dem minst 17G 1,5 mm)
- V sond oralt
- NMT
- värmetycke
- tempmätning
- BIS/Sedline

Peroperativ medicinering

- väsketilförsel som basbehov 3 ml/kg/t under operation, 1,5 ml/kg/t postoperativt
- målet är att hålla patienten euvolem så tät kontroll till förlusten, PPV, BE och laktatvärde
- för ersättning av förlusten; albumin, kristalloid bolus (250 m/15 min) eller ev. blodprodukter

Allmänna synpunkter

Blodrekvisition:	Blodgruppering. BAS test.
Uppläggning:	Ryggläge på planbord. Armarna på armbord.
Antibiotikaproylax:	enligt läkemedelsmodul i Melior.
Trombosproylax:	enligt läkemedelsmodul i Melior.

Postoperativt

För effektiv smärtlindring kan Morfin-spinal kombineras med Oxykodon iv., Catapressan iv, Paracetamol iv.

Arbetsgrupp/Granskare

Camilla Blixt Instruktor, Anestesisjuksköterska Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Henrik Kjölhede, VÖL, VO Urologi, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (cambl2), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2923

Version: 2.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19