Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal
Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare
Granskad av: Irén Sellbrant, (irean15), Överläkare
Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-03
Giltig till: 2028-07-21

Barn och vuxna med särskilda behov som opereras på Mölndal, AnOpIVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Ändrad rubrik. Uppdatering av val av premedicinering. Beskrivning av inskolningsbesök hos sjuksköterska. Ändrat namn i arbetsgrupp.

Bakgrund och syfte

Barn och vuxna med särskilda behov, t ex neuropsykiatriska diagnoser NPF (autism, ADHD, Touretts syndrom och språkstörning), intellektuell funktionsnedsättning mm, kan behöva ett riktat omhändertagande.

Patienten och föräldrar eller assistenter kommer på ett preoperativt mottagningsbesök. Kontakt förmedlas då via preop-koordinator.

Barn och vuxna som ska genomgå tandingrepp är ofta identifierade inom tandvården som då ger oss information i god tid så att vi kan förbereda patienten, föräldrar och anestesipersonal.

Utförande

Preoperativt inskolningssbesök

- Det preoperativa inskolningsbesöket sker på Operation 3, alt på narkosmottagningen. Om möjligt bör det vara samma person som ansvarar för anestesin på operationsdagen.
- Genomgång med hjälp av bildstöd som barnet/vuxne får med sig hem. Bildstödet kan med fördel användas som checklista på operationsdagen.
- Information ska ges om Emla® hemma inför PVK-sättning.
- Titta på stasband, pvk, mask och pox-klämma.

- Visning av lokaler.
- Kontroll av vikt och längd vb.
- I vissa fall kan det vara nödvändigt med premedicinering som skickas med hem. Denna premedicinering ordineras av anestesiläkare i Orbit.

Premedicinering att ta hemma

Vuxen

- Diazepam (Tablett Stesolid®) 5–10 mg (kan ökas vid behov)
- Klonidin (Tablett Catapresan®) (ska tas 1 timme före ankomst till operation)
- <50 kg = 75µg >50kg =150µg vb

Barn

- Diazepam (Tablett Stesolid®) ≤ 0,5 mg/kg, Diazepam är att föredra vid ADHD.
- Klonidin (Tablett Catapresan®) (ska tas 1 timme före ankomst till operation)
- <50 kg = 75µg >50kg =150µg vb
- Oral lösning Catapressan 20µg/ml 2-5 µg/kg max 8 ml.

På operationsdagen

- Ordinarie läkemedel som t.ex. centralstimulantia som metylfenidat ska tas på morgonen. Om det finns ordinarie lugnande mediciner som patienten i normala fall tar hemma på morgonen, skall dessa tas som vanligt på op-dagen.
- Sträva efter att ha barnet/den vuxne först på op-programmet och undvik onödig väntan innan patienten tas om hand.
- Vid ytterligare behov av premedicinering kan patienten efter ankomst till operation ordineras enl. förslag nedan.

Premedicinering på operationsdagen

OxyNorm orallösning 1mg/ml, alt Kapsel Oxynorm 5 mg

Vuxna: 2,5 mg-5 mg p o.

Barn: 0,1 mg/kg p o. Max 5 mg.

Dexdor (kan ges om pat ej fått Klonidin i premedicinering hemma)

Vuxen:	Dexdor® (dexmedetomidin) 100 mikrog/ml, 2 mikrog/kg max 150 mikrog nasalt med hjälp av MAD helst fördelat i bägge näsborrar.
Barn:	1-2 år:1µg/kg, 3-10 år: 1-2 µg/kg, > 10 år: 1-3 µg/kg nasalt. Anslag efter ca 20 min. Max 100 µg. Ges med MAD adapter. Se styrdokument Instruktioner för Nasalt Dexdor med MAD Nasal

Förslag på övrig premedicinering

Sufenta nasalt

Midazolam + Ketanest per os

Tiopental rektalt

Ketalar im kan ges i undantagsfall om ingen annan premedicinering fungerat eller är möjlig.

För dosrekommendationer till barn se https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9805-1593997-293/surrogate/Barn%20-%20dosrekommendationer%20fr%c3%a5n%201%20%c3%a5r%2c%2010%20kg%2c%20AnOpIVA%20M%c3%b6lndal.pdf

Ansvar VEC och VÖL ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs.

Relaterad information.

Information om NPF diagnoser Attention.se

Arbetsgrupp

Cecilia Bondjers, VÖL Operation 4 Mölndal

Irén Sellbrant, funktionsansvarig anestesiläkare Operation 2 Mölndal

Dragana Sesevic, VÖL Operation 1 Mölndal

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Granskad av: Irén Sellbrant, (irean15), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-294

Version: 4.0

Giltig från: 2026-08-03

Giltig till: 2028-07-21