

Barn och vuxna med särskilda behov, Operation 3 Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering av val av premedicinering. Beskrivning av inskolningsbesök hos sjuksköterska.

Bakgrund och syfte

Barn och vuxna med särskilda behov, t ex barn med neuropsykiatriska diagnoser NPF (autism, ADHD, Touretts syndrom och språkstörning), barn med intellektuell funktionsnedsättning mm, kan behöva ett riktat omhändertagande. Barn som ska genomgå tandingrepp är ofta identifierade inom tandvården som då ger oss information om dessa i god tid så att vi kan förbereda barn, föräldrar och anestesipersonal optimalt. Barn och föräldrar kommer på ett preoperativt mottagningsbesök. Kontakt förmedlas då via preop-koordinator.

Utförande

Preoperativt inskolningsbesök

- Det preoperativa inskolningsbesöket sker på Operation 3 hos anestesisjuksköterska eller sjuksköterska på dagvården. Det bör vara samma person som ansvarar för anestesin på operationsdagen.
- Genomgång med hjälp av bildstöd som barnet får med sig hem. Bildstödet kan med fördel användas som checklista på operationsdagen.
- Information ska ges om Emla® hemma inför PVK-sättning.
- Titta på stasband, pvk, mask och pox-klämma.
- Visning av lokaler.

- Kontroll av vikt och längd vb.
- I vissa fall kan det vara nödvändigt med premedicinering som skickas med hem. Denna premedicinering ordineras av anestesiläkare i Orbit.

Premedicinering att ta hemma

Vuxen

- Diazepam (Tablett Stesolid®) 5-10 mg (kan ökas vid behov)
- Klonidin (Tablett Catapresan®) (ska tas 1 timme före ankomst till operation)
- <50 kg = 75µg >50kg =150µg vb

Barn

- Diazepam (Tablett Stesolid®) ≤ 0,5 mg/kg
- Klonidin (Tablett Catapresan®) (ska tas 1 timme före ankomst till operation)
- <50 kg = 75µg >50kg =150µg vb
- Oral lösning Catapressan 20µg/ml 2-5 µg/kg max 8 ml.

På operationsdagen

- Ordinarie läkemedel som t.ex centralstimulantia som metylfenidat ska tas på morgonen. Om det finns ordinare lugnande mediciner som patienten i normala fall tar hemma på morgonen, skall dessa tas som vanligt på op-dagen.
- Sträva efter att ha barnet/den vuxne först på op-programmet och undvik onödig väntan innan patienten tas om hand.
- Vid ytterligare behov av premedicinering kan patienten efter ankomst till operation ordinerars enl. nedan.

Premedicinering på operationsdagen

Dexdor kan ges om pat ej fått Klondin i premedicinering hemma.

Vuxen: Dexdor® (dexmedetomidin) 100 mikrog/ml 2 mikrog/kg
max 150 mikrog nasalt med hjälp av MAD
helst fördelat i bägge näsborrar.

Barn: 1-2 år: 1µg/kg, 3-10 år: 1-2 µg/kg, > 10 år: 1-3 µg/kg
nasalt. Anslag efter ca 20 min. Max 100 µg. Ges med
MAD adapter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kronogård, (karkr5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-294

Version: 3.0

Giltig från: 2024-06-06

Giltig till: 2026-06-05