

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2026-04-13

Innehållsansvar: Andreas Schult, (andsc3), Överläkare

Giltig till: 2028-03-24

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Immunsuppression – Levertransplantation utan IL2-RA

Protokollet används enbart om Basiliximab (Simulect®) inte är tillgängligt!

| | Steroider | Basiliximab | Takrolimus | MMF |
|------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Dag 0 (före påsläpp) | Solu-Medrol 1000 mg iv | UL TX Lever | | |
| Dag 0 (postop) | | | | 1g x 2 po |
| Dag 1 | 20 mg po | | 2 mg x 2 po | ” |
| Dag 2 | 20 mg po | | ” | ” |
| Dag 3 | 20 mg po | | TAC konc: 6-10 | ” |
| Dag 4 | 20 mg po | | ” | ” |
| Dag 5-7 | 20 mg po | | ” | ” |
| Dag 10-14/inför utskr. | 20 mg po | | Slow release preparat (1-dos) | ” |
| 4-12 veckor | 15 - 5 mg po | | TAC konc: 5-8 | ” |
| > 3 mån | Utsättning om inte AIH | | TAC konc: 4-5 | ” |
| > 6 mån | | | TAC konc: 3-5 | ” |
| >12 mån | | | ” | 500mg x 2 |

Takrolimus:

- Vid dålig njurfunktion perioperativt kan man fördröja insättning av takrolimus som längst till dag 2.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Andreas Schult, (andsc3), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2958

Version: 2.0

Giltig från: 2026-04-13

Giltig till: 2028-03-24